arXiv:math/0301032v1 [math.NT] 5 Jan 2003

UNE CORRESPONDANCE DE JACQUET-LANGLANDS p-ADIQUE

Gaëtan CHENEVIER

Ecole normale supérieure, DMA [1]

Université Paris 7

Abstract : In this paper, we extend the Jacquet-Langlands'correspondence, between Hecke-modules of usual modular forms and quaternionic modular forms, to overconvergent p-adic forms of finite slope. We show that this correspondence respects p-adic families and is induced by an isomorphism between some associated eigencurves.

AMS classification : 11F85 (11F12, 11F72, 14G22)

1. Introduction

Soit $D/\mathbb{Q}$ l'algèbre de quaternions définie de discriminant d, p un nombre premier et N un entier tels que $(Np, d) = (N, p) = 1$, nous établissons dans ce texte un transfert "à la Jacquet-Langlands" bijectif entre les formes modulaires p-adiques surconvergentes de pente finie ([K], [C1]), propres, cuspidales et nouvelles en d, et les formes modulaires p-adiques quaternioniques pour D de pente finie ([B2]), en niveau modéré N et poids-caractère quelconque (théorème 5.7). Ce transfert est Hecke-équivariant et coïncide avec la correspondance de Jacquet-Langlands usuelle lorsqu'on le restreint aux formes modulaires "classiques" de part et d'autre. Mieux, il respecte les familles p-adiques, et nous prouvons qu'il provient d'un isomorphisme rigide-analytique entre les courbes de Hecke ("the eigencurves") correspondantes (théorème 6.7).

Notre preuve est basée sur l'existence de systèmes de modules de Banach de part et d'autre (2.1), et de leur comparaison. On démontre en fait un énoncé général (théorème 6.3) sur la comparaison de ces systèmes. Des arguments de Zariski-densité de points "classiques" sur certaines hypersurfaces de Fredholm et sur les variétés de Hecke y jouent un rôle important. On en déduit notre correspondance en utilisant la correspondance de Jacquet-Langlands usuelle, et les assertions de "classicité en petite pente" de part et d'autre.

Un des charmes de cette correspondance est que les objets qu'elle compare sont, dans une large mesure, de natures assez différentes. Les formes modulaires p-adiques surconvergentes usuelles sont des sections de fibrés surconvergentes sur le lieu ordinaire

[1] chenevie@dma.ens.fr

des courbes modulaires, alors que les formes modulaires quaternioniques p-adiques sont purs produits de la théorie des groupes, spécialement des représentations p-adiques de $GL_2(\mathbb{Q}_p)$. Nous y voyons plusieurs intérêts, l'un d'entre eux étant la possibilité d'introduire des méthodes de théorie des représentations p-adiques des groupes de Lie p-adiques dans la théorie des formes modulaires surconvergentes. Ceci est par exemple en accord avec une philosphie de Langlands purement p-adique (encore non formulée à notre connaissance). Un autre intêret vient de qu'il reste une multitude de questions non résolues concernant "the eigencurve" (voir l'introduction de [CM]), l'origine plus combinatoire des formes quaternioniques peut permettre, sinon de les résoudre, de faciliter tout au moins les expériences numériques. Nous discutons de certaines conséquences de notre correspondance, ainsi que de problèmes encore ouverts, dans la dernière partie du texte.

Dans [CH], des variétés de Hecke sont construites pour tous les groupes algébriques G sur $\mathbb{Q}$ tels que $G(\mathbb{R}) = U_n(\mathbb{C})$, $G(\mathbb{Q}_p) = GL_n(\mathbb{Q}_p)$, et on peut se demander de manière générale si les transferts usuels se prolongent, et comment, aux formes modulaires surconvergentes pour ces groupes. En ce qui concerne les correspondances de Jacquet-Langlands éventuelles entre de tels groupes, nos résultats s'y appliquent sans modification, du moment que la correspondance classique entre les deux groupes en question est connue pour suffisament de poids (voir le théorème 6.3).

Ce travail repose substantiellement sur ceux de Buzzard, Coleman, et Mazur, nous les en remercions. La question de l'existence ou non d'un morphisme entre les deux courbes de Hecke avait notamment été posée par K.Buzzard.

Notations : p est un nombre premier. $\mathbb{C}_p$ est le complété d'une clôture algébrique de $\mathbb{Q}_p$, muni de la norme telle que $|p| = 1/p$, $v(.)$ est la valuation associée. Si $X/\mathbb{C}_p$ est un espace rigide, $A(X)$ est l'anneau des fonctions rigides analytiques sur X ; si X est de plus affinoide réduit, la norme sup. sur X munit $A(X)$ d'une structure de $\mathbb{C}_p$-algèbre de Banach. $\mathbb{A}^1$ désigne la droite rigide sur $\mathbb{C}_p$. $\mathbb{A}$ (resp. $\mathbb{A}_f$, resp. $\mathbb{A}_f^{(d)}$) est l'anneau des adèles (resp. adèles finies, resp. adèles hors de $\{d, \infty\}$) de $\mathbb{Q}$. Si d et n sont des entiers, on note $d \parallel n$ si d divise n et $(d, n/d) = 1$. Si B est un anneau, B^* désigne le groupe multiplicatif de ses inversibles. $\mathrm{diag}(a, b)$ désigne la matrice $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$.

Table des matières

1. Introduction 1
2. Systèmes de modules de Banach 3
2.1. Modules de Banach 3
2.2. L'espace des poids-caractères 4
3. Formes modulaires p-adiques 5
3.1. Formes modulaires surconvergentes 5
3.4. Formes modulaires quaternioniques p-adiques 8
4. Préliminaires de théorie spectrale 11
4.1. Semi-simplification en dimension infinie 11

4.4. Un critère de densité 13
5. La correspondance de Jacquet Langlands "p-adique" 14
5.1. Rappels sur la correspondance classique 14
5.3. Structures p-adiques des espaces de formes classiques 16
5.5. La correspondance p-adique à poids-caractère fixé 17
6. La correspondance en familles p-adiques 17
6.1. Une propriété d'unicité pour les variétés spectrales 17
6.6. L'isomorphisme rigide analytique JL_p 21
7. Quelques conséquences, remarques et questions 22
7.1. Opérateurs thêta 22
7.3. Questions 23
Références 23

2. Systèmes de modules de Banach

2.1. **Modules de Banach.** La notion de systèmes de modules de Banach orthonormalisables est introduite dans [CM] §4.3.

On appellera *système d'espaces de Banach* la donnée d'un ensemble $E = \{E_n, i_n, n \in \mathbb{N}\}$ de $\mathbb{C}_p$-espaces de Banach orthonormalisables E_n, et d'applications $\mathbb{C}_p$-linéaires compactes $i_n : E_n \to E_{n+1}$, on notera $E^\dagger$ la limite inductive des E_n selon les i_n. Si $\mathcal{W}/\mathbb{C}_p$ est un espace rigide réduit, on appellera *faisceau de modules de Banach orthonormalisables sur* $\mathcal{W}$ la donnée d'un faisceau B sur $\mathcal{W}$ tel que pour tout ouvert affinoide $V \subset \mathcal{W}$, $B(V)$ ait une structure de $A(V)$-module de Banach orthonormalisable, et tel que si $V \subset V'$ sont des ouverts affinoides de $\mathcal{W}$, l'application canonique $B(V')\widehat{\otimes}_{A(V')}A(V) \to B(V)$ soit un isomorphisme de $A(V)$-modules de Banach. Un *système de modules de Banach sur* $\mathcal{W}$ est la donnée d'un ensemble $E = \{E_n, i_n, n \in \mathbb{N}\}$ où E_n est un faisceau de modules de Banach orthonormalisables sur $\mathcal{W}$, et $i_n : E_n \to E_{n+1}$ est un morphisme de faisceaux tel que si V est un ouvert affinoide de $\mathcal{W}$, $i_n(V) : E_n(V) \to E_{n+1}(V)$ soit $A(V)$-linéaire compacte. On notera alors $E(V, n) := E_n(V)$, et on abrégera le tout en $E = (E(V, n))$. Enfin, on dispose d'une notion évidente de sous-système de modules de Banach sur $\mathcal{W}$.

Exemple : Si $E = \{E_n, i_n, n \in \mathbb{N}\}$ est un système d'espaces de Banach, on peut lui associer un système de modules de Banach sur $\mathcal{W}$ comme suit. Soit $E_{\mathcal{W},n}$ le faisceau de modules de Banach orthonormalisables associé à E_n au sens de [CH] 3.7.2. On rappelle que si V est ouvert affinoide, on a $E_{\mathcal{W},n}(V) := A(V)\widehat{\otimes}_{\mathbb{C}_p}E_n$ que l'on notera encore $E(V, n)$. i_n nous fournit de plus par extension des scalairs une application compacte $A(V)$-linéaire $i_n(V) : E(V, n) \to E(V, n+1)$. On appellera $(E(V, n))$ *le système de modules de Banach sur* $\mathcal{W}$ *associé à* E.

Fixons $E = (E(V, n))$ un système de modules de Banach sur $\mathcal{W}$. Si $x \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, on notera E_x le système d'espaces de Banach déduit de E par évaluation en x : $E_{x,n} := E(V, n)\widehat{\otimes}_{A(V)}\mathbb{C}_p$ pour tout V tel que $x \in V(\mathbb{C}_p)$ ($A(V) \to \mathbb{C}_p$ étant l'évaluation en x), $i_{x,n} : E_{x,n} \to E_{x,n+1}$ l'application compacte déduite. Dans nos applications, les $i_{x,n}$ seront

toujours injectives. C'est par exemple le cas si $E_{\mathcal{W}}$ est le système de modules de Banach sur $\mathcal{W}$ associé a un système d'espaces de Banach $\{E_n,\, i_n,\, n \in \mathbb{N}\}$ tel que les i_n soient injectives.

On appellera endomorphisme de E la donnée, pour chaque $V \subset \mathcal{W}$ ouvert affinoide, et pour tout n assez grand (V étant fixé), d'un endomorphisme continu $A(V)$-linéaire $U(V,n)$ de $E(V,n)$, tel que les $U(V,n)$ commutent aux applications $E(V,n) \to E(V,n+1)$, et aux changements de bases ouverts affinoides $E(V,n) \to E(V',n)$ lorsqu'ils sont définis. On dira que $U := (U(V,n))$ est un endomorphisme de E et on identifiera deux endomorphismes U et U' si pour tout V et n assez grand, $U(V,n) = U'(V,n)$. L'ensemble $\mathrm{End}(E)$ de ces endomorphismes est alors une $\mathbb{C}_p$-algèbre de manière naturelle. Si H est un anneau (resp. G un moinoide), une représentation de H (resp. de G) sur E est la donnée d'un morphisme de $\mathbb{C}_p$-algèbre $H \to \mathrm{End}(E)$ (resp. $\mathbb{C}_p[G] \to \mathrm{End}(E)$). On parlera alors de système de H-modules de Banach sur $\mathcal{W}$.

On note $\mathrm{Comp}(E)$ l'idéal bilatère de $\mathrm{End}(E)$ composé des éléments ayant la propriété suivante : pour $V \subset \mathcal{W}$ un ouvert affinoide fixé, il existe pour tout n assez grand un endomorphisme $A(V)$-linéaire continu $T(V,n) : E(V,n+1) \to E(V,n)$ tel que le diagramme suivant soit commutatif :

$$\begin{tikzcd}
E(V,n) \arrow[r, "U(V,n)"] \arrow[d, "i_n(V)"'] & E(V,n) \arrow[d, "i_n(V)"] \\
E(V,n+1) \arrow[r, "U(V,n+1)"'] \arrow[ur, "T(V,n)"] & E(V,n+1)
\end{tikzcd}$$

En particulier, $U(V,n)$ est compact, et [C2] A.2.3 assure que $\det(1 - U(V,n)_{|E(V,n)}) \in 1 + TA(V)\{\{T\}\}$ est indépendant de n assez grand. La formation des séries de Fredholm commutant aux changements de base ouverts affinoides, toutes ces séries proviennent par restriction d'une unique série de Fredholm $\mathrm{Fred}_E(U)$ sur $\mathcal{W}$, $\mathrm{Fred}_E(U) \in 1 + TA(\mathcal{W})\{\{T\}\}$.

2.2. **L'espace des poids-caractères.**

On fixe $p > 2$ dans ce qui suit, Λ est l'anneau local complet $\mathbb{Z}_p[[(1+p\mathbb{Z}_p)]]$, $\mathcal{W}$ la boule ouverte rigide de centre 1 et rayon 1, $\mathcal{W}(\mathbb{C}_p) := \{z \in \mathbb{C}_p,\ |z-1| < 1\}$. L'application $\Lambda \to A(\mathcal{W})$ définie par $[1+p] \mapsto Z$ identifie topologiquement Λ aux fonctions analytiques $\mathbb{Q}_p$-valuées sur $\mathcal{W}(\mathbb{Q}_p)$ bornées par 1 sur tout $\mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$. L'application $\kappa \mapsto \kappa(1+p)$ induit une bijection :

$$\mathrm{Hom}_{gr-cont}(1+p\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p^*) \simeq \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$$

On dispose d'un caractère "universel" continu déterminé par $\kappa^{univ}(1+p) = Z$:

$$\kappa^{univ} : 1 + p\mathbb{Z}_p \to A(\mathcal{W})^*$$

On note $\mu_{p^\infty} := \{\zeta \in \mathbb{C}_p^*,\ \exists r \in \mathbb{N}, \zeta^{p^r} = 1\}$, $\mu_{p^\infty} \subset \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$. Si $\zeta \in \mathbb{C}_p^*$ est tel que $\zeta^{p^r} = 1$, $\zeta.(1+p)^k \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$ correspond au caractère $x \to x^k\chi(x)$, χ étant le caractère d'ordre fini de $1+p\mathbb{Z}_p$ tel que $\chi(1+p) = \zeta$, caractère que l'on notera (k,χ). Dans ce cas,

on appellera conducteur de κ, noté $\mathrm{cond}(\chi)$, le plus petit entier naturel r tel que χ soit trivial sur $1+p^r\mathbb{Z}_p$.

On aura besoin en 3.4.2 d'introduire pour $r \geq 1$, la boule rigide $\mathcal{W}_r \subset \mathcal{W}$:

$$\mathcal{W}_r(\mathbb{C}_p) := \{\kappa \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p),\ |\kappa - 1| < p^{-\frac{1}{p^{r-1}(p-1)}}\}$$

On a par exemple $(1+p)^k\zeta \in \mathcal{W}_r$ quand $\zeta^{p^{r-1}} = 1$. Tout κ dans $\mathcal{W}_r(\mathbb{C}_p)$ est un caractère de $1+p\mathbb{Z}_p$ de restriction analytique à $1+p^r\mathbb{Z}_p$. Mieux, si $V \subset \mathcal{W}_r$ est ouvert affinoide, la restriction de κ^{univ} à $A(V)$ est un caractère $A(V)$-valué de $1+p\mathbb{Z}_p$ dont la restriction à $1+p^r\mathbb{Z}_p$ est analytique.

On note $\tau : (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \to \mathbb{Z}_p^*$ le caractère de Teichmüller. On verra en général les caractères de $1+p\mathbb{Z}_p$ comme des caractères de $\mathbb{Z}_p^*$, en les étendant trivialement sur les racines de l'unité.

3. Formes modulaires p-adiques

Nous allons dans ce qui suit rappeler les acteurs essentiels de ce papier. On fixe un nombre premier $p \geq 5$, des entiers N et d, $(N,p) = (N,d) = (p,d) = 1$, d sans facteur carré.

Soit $\mathcal{H}$ la $\mathbb{Z}$-algèbre commutative de polynômes sur les lettres S_l, T_l, si l est premier et $(l, Ndp) = 1$, et U_l si l premier divise Ndp. On fixe $\varepsilon = \varepsilon_p\varepsilon_N$ un caractère de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$. On notera aussi, si $n \geq 1$, T_n l'élément de $\mathcal{H}$ obtenu par les formules usuelles :

$$\sum_{n\geq 1} T_n n^{-s} = \prod_{l|Npd}(1-U_l l^{-s})^{-1} \prod_{l\nmid Npd}(1-T_l l^{-s} + lS_l l^{-2s})^{-1}$$

3.1. **Formes modulaires surconvergentes.**

On fait des rappels sur certaines constructions faites dans [CM] §2.1, [C2] §4.3 .

Soit $X_1(Np,d)$ la courbe propre et plate sur $\mathbb{Z}_p$ paramétrant les courbes elliptiques généralisées avec structure de niveau de type $\Gamma_1(Np) \cap \Gamma_0(d)$, ω le faisceau inversible habituel sur $X_1(Np,d)$. Si $p > 3$, on rappelle que la série d'Eisenstein normalisée de niveau 1, E_{p-1}, est une section globale de ω^{p-1} sur $X_1(Np,d)/\mathbb{Z}_p$ qui relève l'invariant de Hasse. Si $0 \leq v < 1 \in \mathbb{Q}$, on définit $X_1(Np,d)(v)$ comme étant l'ouvert affinoide de $X_1(Np,d)^{rig}$ sur lequel $|E_{p-1}| \geq p^{-v}$, et $Z_1(Np,d)(v)$ la composante connexe affinoide de ∞ dans $X_1(Np,d)(v)$ ([CM] §2.1, §4.3). Pour tout $m \geq 1$, on s'intéressera plus généralement ([CM] §2) à la courbe rigide analytique (lisse irréductible) $Z_1(Np^m,d)(v)$, avec $0 \leq v < 1$, qui est la composante connexe affinoide de ∞ dans $X_1(Np^m,d)(v)$.

$$M_k(p^m,d,v) := H^0(Z_1(Np^m,d)(v), \omega^k)$$

est le $\mathbb{C}_p$-espace de Banach des formes modulaires v-surconvergentes de poids k, de niveau $\Gamma_1(Np^m) \cap \Gamma_0(d)$, il est muni d'une action naturelle de $\mathcal{H}$ ([CM] §3.2, [C2] B5). On fixe ici, et pour tout le texte, une suite réelle décroissante $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$, telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = p^{-n}v_0 \in [\frac{p}{p^{n+1}(p+1)}, \frac{p}{p^n(p+1)}[\cap\mathbb{Q}$. La construction de nos systèmes de modules de Banach

dépend de v_0 d'une manière qui nous importera peu, pour alléger les notations nous omettrons cette dépendance dans ce qui suit. On pourrait fixer $v_0 = \frac{1}{p+1}$.

Si $\kappa = (k, \chi) \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$ est de conducteur m, on dispose d'une série d'Eisenstein E_κ, qui est une forme modulaire de poids k sur $X_1(Np^m, d)(v)$ de caractère trivial hors de p, $\chi\tau^{-k}$ en p. Si $0 \leq v < \frac{p}{p^{m-1}p+1}$, $Z_1(Np, d)(v)$ s'identifie canoniquement au quotient de $Z_1(Np^m, d)(v)$ par l'action des diamants de $(1 + p\mathbb{Z}_p)/(1 + p^m\mathbb{Z}_p)$, permettant de voir $M_0(p, d, v)$ comme le sous-espace de $M_0(p^m, d, v)$ de caractère trivial sous $(1+p\mathbb{Z}_p)/(1+p^m\mathbb{Z}_p)$. La multiplication par E_κ est un isomorphisme de $\mathbb{C}_p$-Banach de $M_0(p^m, d, v)$ sur $M_k(p^m, d, v)$ multipliant le caractère en p par $\chi\tau^{-k}$. Le q-développement à l'infini de E_κ est la spécialisation en κ d'un q-développement "abstrait" $\mathbb{E}(q) \in 1 + q\Lambda[[q]]$ appelé famille d'Eisenstein restreinte ([CM], §2.2).

On pose $F := (F(V, n))$, le système de modules de Banach sur $\mathcal{W}$ associé au système d'espaces de Banach $\{A(Z_1(Np, d)(v_n)), \mathrm{res}_n, n \in \mathbb{N}\}$, les applications

$$\mathrm{res}_n : A(Z_1(Np, d)(v_n)) \to A(Z_1(Np, d)(v_{n+1}))$$

étant les restrictions compactes naturelles. Par définition, si $V \subset \mathcal{W}$ est ouvert affinoide, $F(V, n) = A(V \times Z_1(Np, d)(v_n))$. F est de manière naturelle une représentation de $\mathcal{H}$, $U_p \in \mathrm{Comp}(F)$ ([CM] 3.2, [C2] B5). Si $\kappa = (k, \chi) \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$ est de conducteur m, $n \geq m - 1$, $F_{\kappa,n}$ s'identifie, comme représentation de $\mathcal{H}$, au sous-espace de $M_k(p^m, d, v_n)$ de caractère $\chi\tau^{-k}$ sous $(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^*$.

En chaque pointe c dans $Z_1(Np, d)(0)$, la théorie des courbes de Tate (voir [K] A1.2) nous fournit un q_c-développement : $F(V, n) \hookrightarrow A(V)[[q_c]]$. De plus, $(\mathbb{Z}/Np\mathbb{Z})^*$ agit par automorphismes naturels sur $X_1(Np, d)$ en préservant $Z_1(Np, d)(v)$ et donc l'ensemble de ses pointes. Notons $A(Z_1(Np^m, d)(v_n))^{0,\varepsilon}$ le sous-espace de $A(Z_1(Np^m, d)(v_n))$ composé des fonctions de q_c-développement nul pour tout c dans $Z_1(Np, d)(0)$, et sur lequel $(\mathbb{Z}/Np\mathbb{Z})^*$ agit par le caractère ε fixé plus haut. On s'intéresse au système de modules de Banach $F^{0,\varepsilon}$ associé au système d'espaces de Banach

$$\{A(Z_1(Np, d)(v_n))^{0,\varepsilon}, \mathrm{res}_{n|A(Z_1(Np,d)(v_n))^{0,\varepsilon}}, n \in \mathbb{N}\}$$

C'est un sous-système de modules de Banach de F, préservé par $\mathcal{H}$. Son évaluation $F^{0,\varepsilon}_{\kappa,n}$ en $\kappa = (k, \chi) \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$ de conducteur m tel que $n \geq m - 1$ s'identifie au sous-espace de $M_k(p^m, d, v_n)$ composé des formes de caractère $\varepsilon\tau^{-k}\chi$ s'annulant aux pointes de $Z_1(Np^m, d)(0)$ (noter que E_κ est non nulle en chacune de ces pointes).

On définit dans ce qui suit le sous-module de Banach de $F^{0,\varepsilon}$ composé des familles de formes surconvergentes "nouvelles en d" (voir aussi [C2] B5). Soit l premier divisant d, $ld' = d$, on dispose de morphismes canoniques finis et plats

$$\pi_l : X_1(Np^m, d) \to X_1(Np^m, d')$$

oubliant le sous-groupe d'ordre l. Ces morphismes induisent des morphismes rigides analytiques $\pi_l : Z_1(Np^m, d)(v) \to Z_1(Np^m, d')(v)$, finis et plats de degré $l + 1$ (étale hors des pointes). L'isomorphisme canonique $\pi_l^*(\omega) \simeq \omega$ permet d'en considérer la trace,

$\pi_{l*}\omega \to \omega$, d'où en particulier sur les sections sur $Z_1(Np^m, d')(v)$:

$$tr(\pi_l)_k : M_k(p^m, d, v) \to M_k(p^m, d', v)$$

On étend $tr(\pi_l)_0 : A(Z_1(Np, d)(v)) \to A(Z_1(Np, d')(v))$, linéairement en un $A(V)$-morphisme

$$\mathrm{Tr}_l : A(V \times Z_1(Np, d)(v)) \to A(V \times Z_1(Np, d')(v))$$

Tr_l définit ainsi un endomorphisme du module de Banach $F^{0,\varepsilon}$, il est bien défini pour tous les couples (V, n).

Lemme 3.2. *Soit $\kappa = (k, \chi) \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, $m = cond(\kappa)$, $n \geq m - 1$, le diagramme suivant est commutatif :*

$$\begin{array}{ccc} F_{\kappa,n} & \xrightarrow{\times E_\kappa} & M_k(p^m, d, v_n) \\ {\scriptstyle Tr_l}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle tr(\pi_l)_k} \\ F_{\kappa,n} & \xrightarrow{\times E_\kappa} & M_k(p^m, d', v_n) \end{array}$$

Preuve : Il faut montrer que si $f \in M_0(p^m, d, v)$, $tr(\pi_l)_k(E_\kappa f) = E_\kappa tr(\pi_l)_0(f)$, ce qui découle immédiatement de ce que E_κ est de niveau premier à l. $\square$

On vérifie aisément que Tr_l commute aux correspondances de Hecke hors de l, aux opérateurs diamants, et que $\mathrm{Tr}_l^2 = (l+1)\mathrm{Tr}_l$ (cf. [C2] B5.1). Notons W_l l'involution d'Atkin sur $X_1(Np^m, d)/\mathbb{Z}_p$ définie modulairement par $(E, H, \alpha) \mapsto (E/H, E[l]/H, \pi \cdot \alpha)$, H étant un sous-groupe d'ordre l de E, π l'isogénie $E \to E/H$, et α une structure de niveau de type $\Gamma_1(Np^m) \cap \Gamma_0(d')$. Elle préserve les $Z_1(Np^m, d)(v)$ et induit par extension des scalaires une involution encore notée W_l sur les $A(Z_1(Np, d)(v) \times V)$.

Définition : Soit $\kappa \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, $f \in F^{0,\varepsilon}_{\kappa,n}$ est dite nouvelle en d si pour tout l divisant d, $\mathrm{Tr}_l(f) = \mathrm{Tr}_l(W_l(f)) = 0$.

On notera $F^{0,\varepsilon,d}$ le système de modules de Banach sur $\mathcal{W}$ associé au système d'espaces de Banach $\{A(Z_1(Np, d)(v_n))^{0,\varepsilon,d}, res_n, n \in \mathbb{N}\}$, où

$$A(Z_1(Np, d)(v_n))^{0,\varepsilon,d} := A(Z_1(Np, d)(v_n))^{0,\varepsilon} \cap (\bigcap_{l|d} \mathrm{Ker}(\mathrm{Tr}_l) \cap \mathrm{Ker}(\mathrm{Tr}_l \cdot W_l))$$

Lemme 3.3. *$F^{0,\varepsilon,d}$ est un sous-système de modules de Banach de $F^{0,\varepsilon}$ stable par l'action de $\mathcal{H}$.*

Preuve : Ça n'est pas complètement évident en ce qui concerne les U_l avec $l|d$. Il suffit de vérifier que pour $\kappa = (k, \chi) \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, $m = \mathrm{cond}(\kappa)$, $n \geq m - 1$, U_l préserve $F^{0,\varepsilon,d}_{\kappa,n}$ dans $F^{0,\varepsilon}_{\kappa,n}$. Sur $M_k(p^m, d, v_n)$, on dispose d'un endomorphisme $W_{l,k}$ défini par $W_{l,k}(f)(E, H, \alpha, \omega) = f(E/H, E[l]/H, \pi.\alpha, (\pi^\vee)^*(\omega))$, avec les notations évidentes. On vérifie que sur le sous-espace de caractère $\varepsilon\chi\tau^{-k}$, on a $W_{l,k}^2 = \varepsilon(l)\kappa(l)$ et

$$tr(\pi_l)_k(f) = f + l\varepsilon(l)^{-1}\kappa(l)^{-1}U_l(W_{l,k}(f)),\ tr(\pi_l)_k(W_{l,k}(f)) = f + l \cdot U_l(f)$$

De plus, si $g \in F^{0,\varepsilon}_{\kappa,n}$ et e_l désigne la fonction inversible sur $X_1(Np,d)(v_n)$ de q-développement $\frac{E_\kappa(q^l)}{E_\kappa(q)}$, alors un calcul montre que

$$E_\kappa^{-1} W_{l,k}(gE_\kappa) = e_l W_l(g)$$

En particulier, la multiplication par E_κ envoie $F^{0,\varepsilon,d}_{\kappa,n}$ isomorphiquement sur l'intersection des $\mathrm{Ker}(\mathrm{tr}(\pi_l)_k) \cap \mathrm{Ker}(\mathrm{tr}(\pi_l)_k \cdot W_{l,k})$ dans le sous-espace de $M_k(p^m,d,v_n)$ de caractère $\varepsilon\chi\tau^{-k}$. Les relations ci-dessus montrent que ce sous-espace est stable par $W_{l,k}$ puis par U_l, qui coïncide avec $-l^{-1}W_{l,k}$ sur ce dernier. $\square$

Si $\kappa = (k,\chi) \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, $n \geq \mathrm{cond}(\chi)-1$, $F^{0,\varepsilon,d}_{\kappa,n}$ est $\mathbb{C}_p \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{H}$-isomorphe au sous-espace de Banach de $M_k(p^m,d,v_n)$ constitué des formes s'annulant aux pointes de $Z_1(Np^m,d)(0)$, de caractère $\varepsilon\chi\tau^{-k}$, et annulées par les $\mathrm{tr}(\pi_l)_k$ et $\mathrm{tr}(\pi_l)_k \cdot W_{l,k}$. Ces formes seront appelées *nouvelles en d*. Sur le sous-espace de $M_k(p^m,d,v_n)$ composé des restrictions à $Z_1(Np^m,d)(v_n)$ des formes convergentes sur tout $X_1(Np^m,d)$, cette condition d'être nouvelle en d est précisément la condition usuelle.

Remarques : i) Soit $\kappa = (k,\chi) \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$ de conducteur m, $r \in \mathbb{N}$, $f \in F^{0,\varepsilon,d}_{\kappa,r}$ propre pour tout $\mathcal{H}$, on note $\chi : \mathcal{H} \to \mathbb{C}_p$ le caractère défini par $T_n(f) := \chi(T_n)f$. f a un q-développement sur la pointe ∞ de la forme $\sum_{n\geq 1} a_n q^n$ tel que $a_n = \chi(T_n)a_1$. Le principe du q-développement (i.e l'irréductibilité de $Z_1(Np^m,d)(0)$) montre alors que $a_1 \neq 0$, et donc que l'on peut supposer $a_1 = 1$. Ceci définit donc une bijection entre caractères de $\mathcal{H}$ dans $F^{0,\varepsilon,d}_{\kappa,r}$ et les éléments de ce dernier qui sont propres et de q-développement normalisé à 1 ("multiplicité 1 faible").

ii) Les $\mathbb{C}_p$-espaces de Banach $A(Z_1(Np,d)(v))$, ainsi que tous leurs sous-espaces considérés dans ce paragraphe, sont orthonormalisables. En effet, d'après [S1] 1.1, tout espace de Banach provenant par extension des scalairs d'un espace de Banach sur un corps local est orthonormalisable. De plus, par [S1] 1.2, les inclusions $A(Z_1(Np,d)(v_n)) \supset A(Z_1(Np,d)(v_n))^{0,\varepsilon} \supset A(Z_1(Np,d)(v_n))^{0,\varepsilon,d}$ sont scindées dans la catégorie des $\mathbb{C}_p$-espaces de Banach.

3.4. **Formes modulaires quaternioniques p-adiques.**

Dans ce qui suit, nous nous référerons à [B2].

3.4.1. *Séries principales p-adiques de l'Iwahori.* Introduisons tout d'abord quelques notations de théorie des groupes :

$$L \text{ désigne le Borel inférieur de } GL_2(\mathbb{Q}_p)$$

$$N \text{ les unipotents supérieurs de } GL_2(\mathbb{Z}_p)$$

$I(m)$ le sous-groupe de $GL_2(\mathbb{Z}_p)$ composé des éléments triangulaires supérieurs modulo p^m

$$I := I(0) \text{ l'Iwahori}, \quad u := \mathrm{diag}(1,p)$$

$\mathbb{M}(m)$ est le sous-monoide de $GL_2(\mathbb{Q}_p) \cap M_2(\mathbb{Z}_p)$ engendré par $I(m)$ et u, $\mathbb{M} := \mathbb{M}(1)$

La décomposition d'Iwahori s'écrit $I = (L \cap I) \times N$. On identifie N à $\mathbb{Z}_p$ via

$$\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mapsto t$$

La grosse cellule de Bruhat $L\backslash LI \subset L\backslash GL_2(\mathbb{Q}_p) = \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}_p)$ est stable par multiplication à droite par $\mathbb{M}$. On note T la coordonnée sur $\mathbb{Z}_p$, l'action de $\mathbb{M}$ par translation à droite sur les fonctions sur $L\backslash LI = \mathbb{Z}_p$ s'écrit alors

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} .T = \frac{b + dT}{a + cT}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{C}_n$ la $\mathbb{C}_p$-algèbre de Banach des fonctions sur $\mathbb{Z}_p$ de restriction analytique aux $a + p^n\mathbb{Z}_p$, $\mathcal{C}_n$ est stable par l'action de $\mathbb{M}$ et $\mathcal{C}_0$ s'identifie à l'algèbre de Tate $\mathbb{C}_p{<}T{>}$. Les restrictions naturelles $i_n : \mathcal{C}_n \to \mathcal{C}_{n+1}$ sont compactes injectives , ce qui fait de $\mathcal{C} = \{\mathcal{C}_n, i_n, n \in \mathbb{N}\}$ un système d'espaces de Banach tel que $u \in \mathrm{Comp}(\mathcal{C})$. On note $\mathcal{C}_{\mathcal{W}}$ le système de modules de Banach sur $\mathcal{W}$ associé à $\mathcal{C}$. Il sera commode de poser $\mathcal{C}_{-n} := \mathcal{C}_0$ et $\mathcal{C}(V, -n) := \mathcal{C}(V, 0)$ si $n \in \mathbb{N}$, $V \subset \mathcal{W}$ ouvert affinoide.

Soit $j : I \to \mathcal{C}_0^*$ le 1-cocycle défini par

$$j(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}) := \tau^{-1}(a)(a + cT) \in 1 + p\mathbb{Z}_p{<}T{>} \subset \mathcal{C}_0^*$$

Il se prolonge à $\mathbb{M}$ en le prenant trivial sur u. Si $\kappa \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, $\gamma \in \mathbb{M}$, on définit un cocycle $\kappa(j) : \mathbb{M} \to \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{C}_n^*$ par

$$(\kappa(j)(\gamma))(t) := \kappa(j(\gamma)(t)), \quad t \in \mathbb{Z}_p$$

Si $\gamma \in \mathbb{M}(m)$ et $\kappa \in \mathcal{W}_r(\mathbb{C}_p)$, $\kappa(j)(\gamma) \in \mathcal{C}_{r-m}^*$. On notera ρ_κ la représentation de $\mathbb{M}$ sur l'espace $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{C}_n$ tordue par $\kappa(j)$, i.e $\rho_\kappa(v) := \kappa(j)(\gamma)\gamma.v$. Cette torsion n'affecte pas u et si $\kappa \in \mathcal{W}_r(\mathbb{C}_p)$, $\mathbb{M}(m)$ préserve $\mathcal{C}_n$ dès que $n \geq r - m$. Plus généralement, si $V \subset \mathcal{W}$ est un ouvert affinoide, on dispose d'un 1-cocycle $\kappa^{univ}(j) : \mathbb{M} \to \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{C}(V, n)^*$, tel que $\kappa^{univ}(j)_\kappa = \kappa(j)$ si $\kappa \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$ et $\kappa^{univ}(j)(\gamma) \in \mathcal{C}_{r-m}^*$ si $\gamma \in \mathbb{M}(m)$ et $V \subset \mathcal{W}_r$. On dispose donc d'une représentation ρ^{univ} de $\mathbb{M}$ sur $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{C}(V, n)$, en tordant par $\kappa^{univ}(j)$ la représentation naturelle obtenue par extension complète des scalairs à $A(V)$ de celle sur $\mathcal{C}_n$. Si $V \subset \mathcal{W}_r$, $\mathbb{M}(m)$ préserve $\mathcal{C}(V, n)$ dès que $n \geq r - m$.

Ainsi, le système de modules de Banach $\mathcal{C}_{\mathcal{W}}$ sur $\mathcal{W}$ est muni d'une représentation $\rho^{univ} : \mathbb{M} \to \mathrm{End}(\mathcal{C}_{\mathcal{W}})$. Si $V \subset \mathcal{W}_r$, $\mathbb{M}(m)$ préserve $\mathcal{C}(V, n)$ dès que $n \geq r - m$, et on a $u \in \mathrm{Comp}(\mathcal{C}_{\mathcal{W}})$. On appelle $\mathcal{C}_{\mathcal{W}}$ *la famille analytique des séries principales p-adiques de* I.

Remarques : i) $\mathcal{C}^\dagger = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{C}_n$ est l'espace des fonctions localement analytiques sur $\mathbb{Z}_p$, muni de sa topologie localement convexe c'est un espace de type compact au sens de [ST] §1 [2]. La représentation ρ_κ de I sur $\mathcal{C}^\dagger$ est la série principale localement analytique de I de caractère κ ([ST] §5, noter que leur B est l'Iwahori opposé à I).

[2]Strictement, il faudrait plutôt prendre des fonctions K-valuées avec K sphériquement complet.

ii) Les assertions de ce paragraphe sont détaillées dans [B2] §4, §7, noter qu'il a des actions à droites, non à gauche. A cette modification près, on a dans ses notations : $\mathcal{A}_{\kappa,p^{-n}} = \mathcal{C}_{\kappa,n}$ et $M_m \supset \mathbb{M}(m)$; d'autre part si $\kappa \in \mathcal{W}_r(\mathbb{C}_p)\backslash\mathcal{W}_{r-1}(\mathbb{C}_p)$, "$m$ is good for (κ, p^{-n})" équivaut à $n \geq r - m$.

3.4.2. *Formes modulaires.* Soit $D(\mathbb{Q})$ une algèbre de quaternions sur $\mathbb{Q}$, on fixe $D(\mathbb{Z})$ un ordre maximal de $D(\mathbb{Q})$, et on note D le schéma en anneaux sur $\mathbb{Z}$ associé, D^* son groupe des inversibles. On suppose que D est définie. Soit $d = \mathrm{disc}(D)$ le produit des premiers ramifiés, on fixe un isomorphisme au dessus de $\mathbb{Z}[1/d]$,

$$\varphi : D/\mathbb{Z}[1/d] \simeq \mathbb{M}_2/\mathbb{Z}[1/d]$$

Si M est un entier premier à d, on notera $U_1(M)$ (resp. $U_0(M)$) le sous-groupe ouvert compact de $D^*(\mathbb{A}_f) \simeq D^*(\mathbb{A}_f^{(d)}) \times \prod_{l|d} D^*(\mathbb{Q}_l)$, décomposé selon ce produit, valant le compact maximal $D^*(\mathbb{Z}_l)$ en les premiers l divisant d, égal à $\varphi^{-1}(\Gamma_1(M))$ (resp. $\varphi^{-1}(\Gamma_0(M))$) sur l'autre facteur, avec :

$$\Gamma_1(M) = \{g \in GL_2(\widehat{\mathbb{Z}[1/d]}),\ g \equiv \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \bmod M\},$$

$$\Gamma_0(M) = \{g \in GL_2(\widehat{\mathbb{Z}}),\ g \equiv \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \bmod M\}$$

On verra les caractères de $(\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^*$ comme des caractères de $U_0(M)$ par l'étoile supérieure gauche. Si $M \geq 5$, $D^*(\mathbb{Q}) \times U_1(M)$ agit librement sur $D^*(\mathbb{A}_f)$, et $D^*(\mathbb{Q})\backslash D^*(\mathbb{A}_f)/U_1(M)$ est fini de cardinal noté $h_1(M)$. On choisit $M = Np$ comme en 3.

On note F^D le système de modules de Banach sur $\mathcal{W}$ tel que si $V \subset \mathcal{W}$ est ouvert affinoide, $n \in \mathbb{N}$, $F^D(V, n)$ est le $A(V)$-module de Banach des fonctions $f : D^*(\mathbb{Q})\backslash D^*(\mathbb{A}_f) \to \mathcal{C}(V, n)$ satisfaisant

$$f(xu) = j(u_p^{-1})^{-2}\rho^{univ}(u_p^{-1})f(x),\ \forall (x, u) \in D^*(\mathbb{A}_f) \times U_1(Np)$$

et i_n est l'application déduite de la restriction canonique $\mathcal{C}(V, n) \to \mathcal{C}(V, n+1)$. L'orthonormalisabilité vient de ce que $F^D(V, n)$ s'identifie à $\mathcal{C}(V, n)^{h_1(Np)}$ car $Np \geq 5$ (voir aussi [B2] §7, §4).

On a une représentation naturelle sur F^D de $U_0(Np)/U_1(Np) \simeq (\mathbb{Z}/Np\mathbb{Z})^*$, définie par $(< \gamma > .f)(x) = j(\gamma)^{-2}\rho^{univ}(\gamma)f(x\gamma)$. On notera $F^{D,\varepsilon}$ le sous-système de modules de Banach de F^D sur lequel $(\mathbb{Z}/Np\mathbb{Z})^*$ agit par ε^{-1}. On dispose d'une représentation naturelle $\mathcal{H} \to \mathrm{End}(F^{D,\varepsilon})$ telle que $U_p \in \mathrm{Comp}(F^{D,\varepsilon})$. Les doubles classes considérées ici pour les opérateurs de Hecke sont (avec les abus évidents) les $\mathrm{diag}(1, l)$, pour T_l et U_l si $l \nmid d$, $\mathrm{diag}(l, l)$ pour S_l si $l \nmid Npd$, comme en 5.1 pour U_l avec $l|d$. Si $\kappa \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, $F^{D,\varepsilon}_{\kappa,n}$ s'identifie à l'espace des fonctions $D^*(\mathbb{Q})\backslash D^*(\mathbb{A}_f) \to \mathcal{C}_n$ telles que

$$f(xu) = \varepsilon^{-1}(u)j(u_p^{-1})^{-2}\rho_\kappa(u_p^{-1})f(x),\ \forall\, (x, u) \in D^*(\mathbb{A}_f) \times U_0(Np)$$

$(F^{D,\varepsilon}_\kappa)^\dagger$, vu avec sa structure de $\mathcal{H}$-module, est *l'espace des formes modulaires p-adiques quaternioniques de poids-caractère κ, de niveau modéré N, de caractère ε.*

Soient n, m, r des entiers tels que $n \geq r-1 \geq 0$, $n \geq m-1 \geq 0$, et $\kappa \in \mathcal{W}_r(\mathbb{C}_p)$, considérons l'espace annexe $F^{D,\varepsilon}_{\kappa,n}[m]$ des fonctions $f : D^*(\mathbb{Q})\backslash D^*(\mathbb{A}_f) \to \mathcal{C}_{\kappa,n}$ satisfaisant

$$f(xu) = \varepsilon^{-1}(u) j(u_p^{-1})^{-2} \rho_\kappa(u_p^{-1}) f(x),\ \forall (x,u) \in D^*(\mathbb{A}_f^{(d)}) \times U_0(Np^m)$$

C'est un $\mathcal{H}$-module, en prenant cette fois-ci des doubles classes par rapport à $U_0(Np^m)$ (ce qui ne change que U_p, encore défini par la double classe de $\mathrm{diag}(1,p)$). D'après [B2] (§5 lemme 3,iv), $F^{D,\varepsilon}_{\kappa,n-m+1}[m]$ et $F^{D,\varepsilon}_{\kappa,n}$ sont isomorphes comme $\mathcal{H} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}_p$-modules. Si de plus $\kappa = (k,\chi)$ est de conducteur m, et $k \geq 2$, $F^{D,\varepsilon}_{\kappa,0}[m]$ contient comme sous-$\mathcal{H} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}_p$-module l'espace des fonctions à valeurs polynomiales en T de degré $\leq k-2$, ce dernier est isomorphe comme $\mathcal{H} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}_p$-module à l'espace des fonctions $f : D^*(\mathbb{Q})\backslash D^*(\mathbb{A}_f) \to \mathrm{Sym}^{k-2}(\mathbb{C}_p^2)$ telles que

$$f(xu) = \varepsilon(u)^{-1}\chi(u_p)^{-1}\tau^k(u_p)u_p^{-1} f(x),\ \forall\ (x,u)\ \in\ D^*(\mathbb{A}_f) \times U_0(Np^m)$$

Ce $\mathcal{H} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}_p$ module est $S^D_k(Np^m, \varepsilon\chi\tau^{-k}, \mathbb{C}_p)$ dans la notation du §5.3.

4. Préliminaires de théorie spectrale

4.1. **Semi-simplification en dimension infinie.** Soit K un corps valué complet non archimédien (non discret), V un K-espace de Banach orthonormalisable, U un endomorphisme compact de V. La série caractéristique $P(T) = \det(1-TU)$ de U se décompose sous la forme

$$P(T) = \prod_{i \geq 0} P_i(T)^{n_i}$$

où les $P_i(T)$ sont des irréductibles de $1+TK[T]$ deux à deux distincts tels que $|P_i(T) - 1| \underset{i\to\infty}{\to} 0$ pour la norme $|.|$ sur $K[T]$ du sup des coefficients. Par [S1], on sait que V est somme directe topologique de $Ker(U)$ et des espaces de dimension finie $V(P_i) := \mathrm{Ker}(P_i^*(u)^{n_i})$, $Q^*(T)$ désignant le polynôme réciproque de $Q(T)$, sur lesquels U a pour polynôme caractéristique $P_i^*(T)^{n_i}$. Soit H une K-algèbre, $\rho : H \to \mathrm{End}_K(V)$ une représentation telle que $\rho(H)$ contienne U et lui commute, alors $\rho(H)$ stabilise les $V(P_i)$, que l'on peut semi-simplifier.

Définition : On notera $\mathcal{X}_U(V)$ l'ensemble des représentations irréductibles de H apparaissant dans la réunion des semi-simplifications des $V(P_i)$, comptées avec multiplicité (qui sont nécessairement finies).

Notons que $\mathcal{X}_U(V)$ dépend de U, mais que $\mathcal{X}_U(V) = \mathcal{X}_{U'}(V)$ si $U' \in \rho(H)$ est un autre endomorphisme compact de V commutant à $\rho(H)$ et à U tel que $\mathrm{Ker}(U') = \mathrm{Ker}(U)$. Si $\mathcal{X}$ est un ensemble de représentations d'une algèbre, on notera $|\mathcal{X}|$ l'ensemble des classes d'isomorphie de représentations apparaissant dans $\mathcal{X}$ (autrement dit, on oublie les multiplicités).

Proposition 4.2. *Soient (ρ_1, V_1) et (ρ_2, V_2), des représentations d'une K-algèbre H dans les endomorphismes continus de V_1 et V_2, telles que V_i $(i = 1,2)$ est muni d'un endomorphisme compact U_i commutant à $\rho_i(H)$.*

On suppose de plus que pour tout $h \in H$, $\det(1 - T\rho_1(h)U_1) = \det(1 - T\rho_2(h)U_2) \in K\{\{T\}\}$. *Alors* $\mathcal{X}_{U_1}(V_1) = \mathcal{X}_{U_2}(V_2)$.

Preuve : Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $i \in \{1, 2\}$, V_i^α le plus grand sous-espace de dimension finie de V_i stable par U_i sur lequel le polygone de Newton du polynôme caractéristique de U_i est de pente α. Soit $h \in H$, $\rho_i(h)$ stabilise les V_i^α, et ses valeurs propres sur ces derniers sont toutes bornées par $||\rho_i(h)|| < \infty$, $||.||$ désignant la norme d'opérateur sur V_i. Soit $x \in K^*$ tel que $|x| < 1$, on peut trouver par conséquent un $N \in \mathbb{N}$ tel que $\rho_i(1 + x^N h)$ ait toutes ses valeurs propres de norme 1 sur les V_i^α $(i = 1, 2)$. On pose $h' = 1 + x^N h \in H$. En co-trigonalisant U_i et $\rho_i(h')$ sur V_i^α, on en déduit :

$$\det(1 - TU_i\rho_i(h'))^\alpha = \det(1 - TU_i\rho_i(h')_{|V_i^\alpha})$$

Si $Q \in 1+TK\{\{T\}\}$, Q^α désigne le polynôme $\in 1+TK[T]$ divisant Q tel que le polygone de Newton de Q/Q^α n'a pas la pente α. Ainsi, $\det(1 - T\rho_1(h')U_1) = \det(1 - T\rho_2(h')U_2)$ donne

$$\det(1 - T\rho_1(h')U_{1|V_1^\alpha}) = \det(1 - T\rho_2(h')U_{2|V_2^\alpha})$$

$\rho_i(h)U_i$ étant injectif sur V_i^α, notons que cela implique que $\dim(V_1^\alpha) = \dim(V_2^\alpha)$, et que $\rho_1(h')U_{1|V_1^\alpha}$ et $\rho_2(h')U_{2|V_2^\alpha}$ ont même polynôme caractéristique. Ceci reste vrai pour les même raisons en remplaçant h' par $h' + \lambda$ pour (une infinité de) $\lambda \in K$ assez petit. Si A et B sont deux endomorphismes qui commutent d'un K-espace vectoriel de dimension finie r, avec A inversible, la donnée de

$$\det(X.1 - A(B + Y.1)) = \prod_{i=1}^{r}(X - a_iY - b_i) \in \overline{K}[X, Y]$$

permet de retrouver $\det(X.1 - B) = \prod_{i=1}^{r}(X - (b_i/a_i))$ (ici $\overline{K}$ est une clôture algébrique de K). On en déduit $\det(T - \rho_1(h')_{|V_1^\alpha}) = \det(T - \rho_2(h')_{|V_2^\alpha})$, puis la même chose en remplaçant h' par h. Ainsi, V_1^α et V_2^α sont deux représentations de H ayant même polynômes caractéristiques, on sait alors que leurs semi-simplifications sont isomorphes, ce qui conclut. □

Terminons cette partie par une légère amélioration de 4.2. Soient E^i, $i = 1, 2$, deux systèmes d'espaces de Banach, munis de représentations $\rho_i : H \to \mathrm{End}(E^i)$ et d'endomorphismes compacts $U_i \in \mathrm{Comp}(E^i)$, $U_i \in \rho_i(H)$ commutant à $\rho_i(H)$. $E^{i,\dagger}$ est muni d'une opération de $\rho_i(H)$ et U_i. Si $\alpha \in \mathbb{R}$ est fixé et $E_n^{i,\alpha}(U_i)$ désigne le sous-espace de E_n^i sur lequel U_i est de pente α, i_n induit pour tout n assez grand une bijection $E_n^{i,\alpha}(U_i) \to E_{n+1}^{i,\alpha}(U_i)$ qui commute à U_i. Cet espace définit donc un sous-espace de dimension finie $E^{i,\alpha}(U_i)$ de $E^{i,\dagger}$ qui hérite d'une représentation de H. Ceci permet de définir à nouveau $\mathcal{X}_{U_i}(E^i)$ comme étant l'ensemble des représentations (comptées avec multiplicités) de H apparaissant dans les semi-simplifications des $E^{i,\alpha}(U_i)$, α variant dans $\mathbb{R}$.

Corollaire 4.3. *Sous ces hypothèses, supposons que pour tout* $h \in H$, $\det(1-T\rho_1(h)U_1) = \det(1 - T\rho_2(h)U_2) \in K\{\{T\}\}$. *Alors* $\mathcal{X}_{U_1}(E^1) = \mathcal{X}_{U_2}(E^2)$.

Preuve : Fixons $\alpha \in \mathbb{R}$, $E^{i,\alpha}(U_i)$ est de dimension finie, H agit donc sur $E^{1,\alpha}(U_1) \oplus E^{2,\alpha}(U_2)$ à travers un quotient de dimension finie. Considérons une sous-K-algèbre H_0 de H de type fini sur K engendrant toute l'image de H dans ce quotient ; pour n assez grand, H_0 et U_i agissent alors par endomorphismes sur E^i_n, $i = 1, 2$. On applique la proposition 4.2 avec $V_i = E^i_n$, il vient $\mathcal{X}_{U_1}(E^{1,\alpha}(U_1)) = \mathcal{X}_{U_2}(E^{2,\alpha}(U_2))$, ce qui conclut. □

4.4. **Un critère de densité.** On fixe M un système de modules de Banach comme en §2.1, $\dim(\mathcal{W}) > 0$, muni d'une action d'une $\mathbb{C}_p$-algèbre H, et d'un endomorphisme compact U lui commutant, on notera (M, H, U) une telle donnée. On rappelle que si $T/\mathbb{C}_p$ est un espace rigide, un sous-ensemble $X \subset T(\mathbb{C}_p)$ est dit Zariski-dense si pour tout fermé analytique F de T tel que $X \subset F(\mathbb{C}_p)$, alors $F(\mathbb{C}_p) = T(\mathbb{C}_p)$. Soit $X \subset \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$ un sous-ensemble Zariski-dense, tel que pour tout $x \in X$ et tout voisinage ouvert affinoide irréductible V de x dans $\mathcal{W}$, $V(\mathbb{C}_p) \cap X$ est Zariski-dense dans V. On dira alors que X est **très Zariski-dense dans** $\mathcal{W}$. C'est par exemple le cas des points de la forme $\zeta(1+p)^k$, avec $\zeta^{p^m} = 1$ et $k, m \in \mathbb{N}$, dans la boule ouverte de centre 1 de rayon 1 de $\mathbb{C}_p$.

On se fixe de plus une "structure classique sur X", on entendra par là la donnée pour tout $x \in X$ d'un sous-espace vectoriel de dimension finie M^{cl}_x de $M^\dagger_x$ stable par l'action de H. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, on notera $M^{\leq\alpha}_x$ (resp. M^α_x) le sous-espace de dimension finie de $M^\dagger_x$ sur lequel U est de pente au plus α (resp. exactement α). On fera de plus l'hypothèse de "contrôle" :

(Cl) Si $\alpha \in \mathbb{R}$, $U \subset \mathcal{W}$ ouvert affinoide, alors pour tout $x \in X \cap U(\mathbb{C}_p)$ sauf peut-être un nombre fini d'entre eux, $M^{\leq\alpha}_x \subset M^{cl}_x$

Proposition 4.5. *Soient (M_1, H, U) et (M_2, H, U) deux systèmes de modules de Banach sur $\mathcal{W}$ relativement factoriel. On se donne $X \subset \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$ un ensemble très Zariski-dense, et une structure très classique sur X pour M_1 et M_2, chacune de ces structures satisfaisant (Cl). Soit $h \in H$, supposons*

$$\forall x \in X, \quad \det(1 - ThU_{|M^{cl}_{1,x}}) = \det(1 - ThU_{|M^{cl}_{2,x}}) \in \mathbb{C}_p[T]$$

Alors $Fred_{M_1}(hU)$=$Fred_{M_2}(hU)$.

Preuve : Soit $Z_i \subset \mathcal{W} \times \mathbb{A}^1$ l'hypersurface de Fredholm de P_i :=$\mathrm{Fred}_{M_i}(hU)$, p_i la première projection $Z_i \to \mathcal{W}$. On dira que $z \in Z_i(\mathbb{C}_p)$ est classique si $z = (x, \lambda)$ avec $x \in X$ et si λ^{-1} est valeur propre de hU sur $M^{cl}_{i,x}$. On montrera plus bas que les points classiques sont Zariski-denses dans $Z_i(\mathbb{C}_p)$, admettons le pour l'instant. Par hypothèse, P_1 s'annule sur les points classiques de $Z_2(\mathbb{C}_p)$, donc sur $Z_2(\mathbb{C}_p)$ par Zariski-densité. Par symétrie, il vient $Z^{\mathrm{red}}_1 = Z^{\mathrm{red}}_2$ et on déduit de [C] 4.3.2 que P_1 et P_2 ont même facteurs irréductibles, il reste à prouver que ces derniers ont même multiplicités.

Soit Π un de ces facteurs irréductibles, de multiplicité n_i dans P_i, $Z(\Pi)_i \subset Z_i$ la composante irréductible associée. Soit W_i l'ouvert de $Z(\Pi)_i$ dont le complémentaire est l'ensemble points de $Z(\Pi)_i$ qui sont dans au moins deux composantes irréductibles de Z_i. Admettons pour l'instant que l'on puisse trouver $x \in X$ et $z = (x, \lambda) \in W_1(\mathbb{C}_p) = W_2(\mathbb{C}_p)$ tels que λ soit une racine de $\det(1 - ThU_{|M^{cl}_{i,x}})$ mais pas de $P_i(x, T)/\det(1 - ThU_{|M^{cl}_{i,x}})$. Par le choix de W_i, λ est une racine de $P_i(x, T)$ qui est en fait une racine de $\Pi(x, T)$

mais pas des autres facteurs irréductibles. La multiplicité de λ comme racine de $P_i(x,T)$ est donc de la forme $n_i n$ où n est la multiplicité de λ comme racine de $\Pi(x,T)$. Mais, par le choix de z, nn_i est aussi la multiplicité de λ comme racine de $\det(1-ThU_{|M^{cl}_{i,x}})$, qui ne dépend pas de i. Ainsi, $n_1 n = n_2 n$, puis $n_1 = n_2$.

Il reste à trouver un tel z et à prouver que les points classiques sont Zariski-denses dans $Z_i(\mathbb{C}_p)$. Par hypothèse sur $\mathcal{W}$ et [C] 4.3.2, les composantes irréductibles de Z_i sont des hypersurfaces de Fredholm. Ces dernières étant d'image Zariski-ouverte dans $\mathcal{W}$, elles contiennent toutes des points d'image (par p_i) dans X. Soit z_i un de ces points, appartenant a une composante irréductible T_i de Z_i, et soit $\Omega_i \in \mathcal{C}(Z_i)$ contenant z_i. $\mathcal{C}(Z_i)$ désigne le recouvrement canonique de l'hypersurface de Fredholm Z_i (voir la discussion au début de 6.1). Ω_i étant fini et plat sur son image $V_i \subset \mathcal{W}$ (que l'on peut supposer irréductible), chacune de ses composantes irréductibles se surjecte sur V_i. hU et U sont des endomorphismes de $M_i(V_i,n)$ pour un n assez grand que l'on fixe, et $P_i(T)_{|V_i} = \det(1-ThU_{|M_i(V_i,n)}) \in 1+A(V_i)T\{\{T\}\}$. Par choix de $\Omega_i \in \mathcal{C}(Z_i)$ et un théorème de Coleman ([CM] §7.1, [C2] A.4.3), on peut trouver un sous-$A(V_i)$-module N_i de $M_i(V_i,n)$ localement libre de rang fini, stable par U et hU, tel que Ω_i soit le fermé des zéros de $\det(1-ThU_{|N_i})$ dans $V_i \times \mathbb{A}^1$. hU est un endomorphisme inversible de N_i, ainsi donc que U, et ils sont automatiquement continus ([BGR] 3.7.3 proposition 2). En particulier, les valeurs propres de U^{-1} sur les $N_{i,x}$, $x \in V_i(\mathbb{C}_p)$, sont bornées par une constante ne dépendant que des V_i. Ceci et (Cl) impliquent que pour tout $x \in X \cap V_i(\mathbb{C}_p)$ sauf peut-être un nombre fini d'entre eux, $\Omega_i(\mathbb{C}_p) \cap p_i^{-1}(\{x\})$ est composé de points classiques. $X \cap V_i(\mathbb{C}_p)$ étant Zariski-dense dans $V_i(\mathbb{C}_p)$, et $\Omega_i \to V_i$ étant fini et plat, on en déduit que les points classiques sont Zariski-denses dans chaque composante irréductible de Ω_i, et en particulier dans $Z_i(\mathbb{C}_p)$ et $T_i(\mathbb{C}_p)$ ([C] 2.2.3). Plus exactement, on en déduit que l'ensemble des points $z=(x,\lambda)$ tels que $M^{hU=\lambda^{-1}}_{i,x} \subset M^{cl}_{i,x}$ est Zariski-dense dans $T_i(\mathbb{C}_p)$. $M^{hU=\lambda^{-1}}_{i,x}$ désigne ici le sous-espace de $M_{i,x}$ qui est l'espace caractéristique pour la valeur propre λ^{-1} de l'endomorphisme compact hU.

On appliquant cela à $T_i := Z(\Pi)_i$. $\Omega_i \cap W_i$ est un ouvert de Ω_i et contient donc des points du type précédent. Si (x,λ) en est un, λ est une racine de $\det(1-ThU_{|M^{cl}_{i,x}})$ mais pas de $P_i(x,T)/\det(1-ThU_{|M^{cl}_{i,x}})$, c'est juste ce qui nous manquait pour conclure. □

5. La correspondance de Jacquet Langlands "p-adique"

5.1. **Rappels sur la correspondance classique.** Si $M \in \mathbb{N}$, on pose :

$$K_1(M) = \{g \in GL_2(\widehat{\mathbb{Z}}),\ g \equiv \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \bmod M\},$$

$$K_0(M) = \{g \in GL_2(\widehat{\mathbb{Z}}),\ g \equiv \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \bmod M\}$$

On pourra voir, par l'étoile inférieure droite, les caractères complexes de $(\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^*$ comme des caractères de $K_0(M)$. On fixe ε un tel caractère, ainsi qu'un entier $k \geq 2$.

Le $\mathbb{C}$-espace vectoriel $S_k(M,\varepsilon)$ des formes modulaires paraboliques de poids k, de niveau M, de caractère $\varepsilon : (\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^* \to \mathbb{C}$ s'identifie à l'espace des fonctions complexes

sur $GL_2(\mathbb{Q})\backslash GL_2(\mathbb{A})/K_1(M)$, de caractère central $|.|^{2-k}\varepsilon^{-1}$, de caractère ε^{-1} sous $K_0(M)$, satisfaisant les conditions usuelles de croissance aux pointes et holomorphie, en associant à f (voir par exemple [H] §3.1 pour des détails) [3]

$$g = (g_\infty, g_f) \in GL_2^+(\mathbb{R}) \times K_0(M) \mapsto |\det(g)|^{1-k/2} f_{|_k g_\infty}(i)\varepsilon^{-1}(g_f)$$

Cette identification préserve l'action des opérateurs de Hecke usuels (non renormalisés du côté adélique). Soit l premier, l'opérateur de Hecke T_l si $(l, M) = 1$, U_l sinon, est donné par la double classe $U_0(M)\mathrm{diag}(l, 1)U_0(M)$; si $(l, M) = 1$, $S_l = l^{k-2}\varepsilon(l)$ est l'action de $\mathrm{diag}(l, l)$ (ici, on voit $\mathrm{diag}(a, b) \in GL_2(\mathbb{A})$ partout trivial sauf en l où il vaut effectivement $\mathrm{diag}(a, b)$).

On notera $S_k(M, \varepsilon)^{d-new}$ le sous-espace de $S_k(M, \varepsilon)$ composé des formes d-nouvelles au sens usuel.

On fixe un entier d sans facteur carré, ayant un nombre impair de diviseurs premiers, tel que $d \parallel M$ et que ε soit trivial sur $(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z})^*$. On reconsidère $D(\mathbb{Q})$ l'algèbre de quaternions de discriminant d introduite en 3.4.2. $K_1(M)$ (resp. $K_0(M)$) est le compact ouvert de $D^*(\mathbb{A}_f)$ décomposé place par place, qui vaut $D(\mathbb{Z}_p)^*$ aux places $p|d$, $\varphi^{-1}(K_1(M))$ (resp. $\varphi^{-1}(K_0(M))$) hors de d (cf. 3.4.2), noter que $K_1(M) \neq U_1(M)$.

On note $S_k^{*,D}(M, \varepsilon)$ le $\mathbb{C}$-espace vectoriel des fonctions complexes sur $D^*(\mathbb{Q})\backslash D^*(\mathbb{A})/K_1(M)$, de caractère ε^{-1} sous $K_0(M)$, de caractère central $|\det(g)|^{2-k}\varepsilon^{-1}$, engendrant sous $D^*(\mathbb{R})$ un multiple du dual de la représentation $\mathrm{Sym}^{k-2}(\mathbb{C}^2)$. Si $k = 2$ et $\varepsilon = 1$, on note S la droite des fonctions constantes sur $D^*(\mathbb{A})$ dans $S_2^{*,D}(M, 1)$, elle est stable par $D^*(\mathbb{A})$.

Théorème 5.2. *(Arthur, Jacquet, Langlands) Si $k > 2$ ou $\varepsilon \neq 1$, les $\mathbb{C}$-espaces vectoriels $S_k^{*,D}(M, \varepsilon)$ et $S_k(M, \varepsilon)^{d-new}$ sont isomorphes en tant que modules sous l'algèbre de Hecke de $GL_2(\mathbb{A}_f^{(d)})$. Si $k = 2$, $\varepsilon = 1$, c'est encore vrai en remplaçant $S_2^{*,D}(M, 1)$ par $S_2^{*,D}(M, 1)/S$.*

L'action des opérateurs de Hecke dans cette correspondance se précise de plus en $l|d$, en faisant correspondre à U_l, l'opérateur de Hecke de $S_k^{*,D}(M, \varepsilon)$ donné par la double classe $K_0(M)\pi_l K_0(M)$, où $\pi_l \in D^*(\mathbb{A}_f)$ est partout trivial sauf en l où il vaut une (quelconque) uniformisante de $D(\mathbb{Z}_l)$. On notera encore U_l cet opérateur de Hecke pour D^*.

Il se trouve que nous n'allons pas considérer exactement l'espace $S_k^{*,D}(M, \varepsilon)$, mais un autre légèrement différent (ce qui explique la notation $*$ provisoire), qui lui est isomorphe comme module sous l'algèbre de Hecke. Soit

$$\omega_M := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ M & 0 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{Q})$$

on le voit comme un élément de $D^*(\mathbb{A})$ trivial aux places divisant d et à l'infini, diagonalement ω_M dans $D^*(\mathbb{A}_f^{(d)}) = GL_2(\mathbb{A}_f^{(d)})$. ω_M normalise $K_0(M)$ et agit par $\mathrm{diag}(a, b) \mapsto \mathrm{diag}(b, a)$ sur le tore diagonal de $GL_2(\mathbb{A}_f^{(d)})$.

[3] $f_{|_k g}(z) := f(g(z))j(g, z)^{-k}\det(g)^{k/2}$, $g \in GL_2(\mathbb{R})^+$, en particulier, si $g \in Z(\mathbb{R})$, $f_{|_k g} = f$

L'application $f \mapsto \omega_M.f$ induit un isomorphisme $\mathbb{C}$-linéaire de $S_k^{*,D}(M,\varepsilon)$ sur l'espace des fonctions complexes sur $D^*(\mathbb{Q})\backslash D^*(\mathbb{A})/U_1(M)$ de caractère ε^{-1} sous $U_0(M)$, de caractère central $|\det(g)|^{2-k}\varepsilon^{-1}$, engendrant sous $D^*(\mathbb{R})$ un multiple du dual de $\mathrm{Sym}^{k-2}(\mathbb{C}^2)$.

On note $S_k^D(M,\varepsilon)$ ce $\mathbb{C}$-espace vectoriel muni de l'action de l'algèbre de Hecke obtenue par transport. Explicitement, si l est premier ne divisant pas d, l'opérateur de Hecke T_l si $(l,M)=1$, U_l sinon, est donné par la double classe $U_0(M)\mathrm{diag}(1,l)U_0(M)$; si $(l,M)=1$, $S_l = l^{k-2}\varepsilon(l)$ est l'action de $\mathrm{diag}(l,l)$, U_l est inchangé si $l|d$.

Comme en 3, $\mathcal{H}$ désigne la $\mathbb{Z}$-algèbre de polynômes sur les lettres T_l, S_l si l premier ne divise pas M, U_l si $l|M$. Par ce que l'on vient de dire plus haut, $S_k^D(M,\varepsilon)$ et $S_k(M,\varepsilon)^{d-new}$ sont deux $\mathcal{H}$-modules isomorphes, avec la même exception pour $k=2$ que dans 5.2.

5.3. **Structures p-adiques des espaces de formes classiques.**

Nous allons introduire une $\mathbb{Q}_p$-structure sur les espaces $S_k^D(M,\varepsilon)$ et $S_k(M,\varepsilon)$. On fixe pour cela p premier, $\iota : \mathbb{C}_p \to \mathbb{C}$ un isomorphisme de corps, $K \subset \mathbb{C}_p$ un sous-corps complet, et $M = Npd$ avec N, p et d comme en §3.

La courbe modulaire $X_1(M)$ a une structure naturelle sur $\mathbb{Q}_p$, préservée par les correspondances de Hecke. Soit $S_k(M,\varepsilon,K)$ le sous K-espace vectoriel de $H^0(X_1(M)/K,\omega^k)$ composé des formes paraboliques de caractère ε. Notons que par "$GAGA$ rigide analytique", ce $\mathcal{H}$-module est canoniquement isomorphe à son analogue sur $X_1(M)^{rig}/K$. La formation du $\mathcal{H}$-module $S_k(M,\varepsilon,K)$ commute à l'extension des scalaires sur K et la donné de ι identifie $S_k(M,\varepsilon,\mathbb{C}_p)$ et $S_k(M,\varepsilon)$.

$S_k^D(M,\varepsilon,K)$ le K-espace vectoriel des fonctions $f : D^*(\mathbb{Q})\backslash D^*(\mathbb{A}_f) \to \mathrm{Sym}^{k-2}(K^2)$ satisfaisant

$$f(xu) = \varepsilon(u)^{-1}u_p^{-1}f(x), \quad \forall (x,u) \in D^*(\mathbb{A}_f) \times U_0(M)$$

c'est un $\mathcal{H}$-module de manière naturelle. La formation du $\mathcal{H}$-module $S_k^D(M,\varepsilon,K)$ commute à l'extension des scalaires sur K et la donnée de ι identifie $S_k^D(M,\varepsilon,\mathbb{C}_p)$ et $S_k^D(M,\varepsilon)$, on rappelle comment dans ce qui suit.

A une fonction $f \in S_k^D(M,\varepsilon)$ est associé par définition un morphisme $D^*(\mathbb{R})$-équivariant φ_f de $\mathrm{Sym}^{k-2}(\mathbb{C}^2)^*$ vers l'espace des fonctions complexes sur $D^*(\mathbb{Q})\backslash D^*(\mathbb{A})/U_1(M)$. Si $x \in D^*(\mathbb{A})$,

$$v \mapsto \varphi_f(v)(x)$$

définit par dualité un unique élément $F_f(x) \in \mathrm{Sym}^{k-2}(\mathbb{C}^2)$. On considère alors l'application qui à f associe l'élément de $S_k^D(M,\varepsilon,\mathbb{C}_p)$ défini par

$$x_f \mapsto x_p^{-1}\iota^{-1}(F_f(1 \times x_f))$$

c'est l'isomorphisme cherché comme on le vérifie immédiatement.

Si $S_k(M,\varepsilon,\mathbb{Q}_p)^{d-new}$ désigne le sous-espace de $S_k(M,\varepsilon,\mathbb{Q}_p)$ composé des formes nouvelles en d de $S_k(M,\varepsilon,\mathbb{Q}_p)$, il vient

Proposition 5.4. *Si $k > 2$ ou $\varepsilon \neq 1$, les $\mathcal{H} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}_p$-modules $S_k(M,\varepsilon,\mathbb{Q}_p)^{d-new}$ et $S_k^D(M,\varepsilon,\mathbb{Q}_p)$ sont isomorphes. $S_2(M,1,\mathbb{Q}_p)$ est $\mathcal{H}$-isomorphe au quotient de $S_2^D(M,1,\mathbb{Q}_p)$ par la droite des fonctions constantes.*

5.5. **La correspondance p-adique à poids-caractère fixé.** On reprend les notations du § 3, et on s'intéresse aux systèmes de modules de Banach sur $\mathcal{W}$,

$$M^1 := F^{0,\varepsilon,d} \quad et \quad M^2 := F^{D,\varepsilon}$$

Comme on l'a vu, ils sont munis d'une action de l'algèbre $H := \mathcal{H}$, et $U_i := \rho_i(U_p) \in \mathrm{Comp}(M^i)$ commute à $\rho_i(H)$. On pose $X := \{\zeta(1+p)^k, k \geq 2, \zeta \in \mu_{p^\infty}\} \subset \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, il est très Zariski-dense dans $\mathcal{W}$. On munit M^1 et M^2 de structures classiques sur X en posant pour $M^{i,cl}_{\zeta(1+p)^k}$, $k \geq 3$, $\zeta^{p^m} = 1$,

- le sous-espace de $F^{0,\varepsilon,d}_{\zeta(1+p)^k,n}$, avec n quelconque tel que $n \geq m-1$, des restrictions à $X_1(Np^m, d)(v_n)$ des sections de ω^k convergentes sur tout $X_1(Np^m, d)/\mathbb{C}_p$, s'annulant à *toutes* les pointes de $X_1(Np^m, d)/\mathbb{C}_p$, si $i = 1$.
- le sous-espace $S^D_k(Np^m, \varepsilon\chi\tau^{-k}, \mathbb{C}_p)$ de $F^{D,\varepsilon}_{\zeta(1+p)^k,n}$, $n \geq m-1$ quelconque, défini à la fin du paragraphe 3.4.2.

Ce sont bien des structures classiques, satisfaisant (Cl) en $(1+p)^k\zeta$ dès que $\alpha < k-1$ par les assertions connues de classicité en pente petite devant le poids ([C1] §8, [C3] 1.1,[B2] §4). Il faut noter qu'une forme modulaire de poids k sur $X_1(Np^m, d)$ qui est propre pour U_p de pente strictement inférieure à $k-1$, et qui s'annule en toutes les pointes de $Z_1(Np^m, d)(0)$, est en fait parabolique. On est alors dans les hypothèses de la proposition 4.5 par le théorème 5.2. On en déduit le

Théorème 5.6. *Soit $h \in \mathcal{H}$, alors $Fred_{F^{0,\varepsilon,d}}(hU_p) = Fred_{F^{D,\varepsilon}}(hU_p)$*

Remarques :

- Il est aisé de voir que le membre de droite de cette égalité est en fait dans $1 + T\Lambda\{\{T\}\}$, ainsi donc que le premier.
- On aurait pu se restreindre, dans notre choix de l'ensemble X, à celui de $\{(1+p)^k, k \geq 3\}$ pour obtenir le même résultat 5.6. Via le théorème 6.7 (qui n'utilise que le résultat de 5.6), on peut alors déduire de la propriété (Cl) pour les formes quaternionique, et de [C1], une nouvelle preuve du théorème de contrôle de [C3].

Soit $\kappa \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, on dispose de deux systèmes d'espaces de Banach $F^{0,\varepsilon,d}_\kappa$ et $F^{D,\varepsilon}_\kappa$, munis de représentations de $\mathcal{H}$. Le corollaire 4.3 implique le

Théorème 5.7. $\mathcal{X}_{U_p}(F^{0,\varepsilon,d}) = \mathcal{X}_{U_p}(F^{D,\varepsilon})$

Autrement dit, l'espace des formes modulaires paraboliques surconvergentes de pente finie, de poids-caractère κ, de niveau modéré Nd, nouvelles en d, de caractère ε et l'espace des formes modulaires quaternioniques p-adiques de pente finie, poids-caractère κ, de niveau modéré N, de caractère ε, ont même semi-simplification comme $\mathcal{H}$-module.

6. La correspondance en familles p-adiques

6.1. **Une propriété d'unicité pour les variétés spectrales.** Soit $\mathcal{W}/\mathbb{C}_p$ un espace rigide réduit, soit M la donnée d'un système de modules de Banach orthonormalisables sur $\mathcal{W}$, muni d'une représentation d'une $\mathbb{C}_p$-algèbre commutative $\rho : H \to \mathrm{End}(M)$, et d'un $U \in H$ tel que $\rho(U) \in \mathrm{Comp}(M)$. A une telle donnée (M, U, H), on peut attacher la

série de Fredholm $\mathrm{Fred}_M(U) \in 1+TA(\mathcal{W})\{\{T\}\}$, et l'hypersurface de Fredholm associée $Z \subset \mathcal{W} \times \mathbb{A}^1$ définie par $\mathrm{Fred}_M(U)$=0, munie de ses deux projections $(pr_1, pr_2) : Z \to \mathcal{W} \times \mathbb{A}^1$. On sait alors que Z a un recouvrement admissible canonique $\mathcal{C} := \mathcal{C}(\mathrm{Fred}_M(U))$, composé des ouverts affinoides $\Omega \subset Z$ finis et plats sur leur image $pr_1(\Omega)$, et ouverts fermés dans $pr_1^{-1}(pr_1(\Omega))$ ([C2] A5.8, ce qui suffit pour nos applications, [B1] §4 pour le cas général). On sait de plus construire par recollement à l'aide de $\mathcal{C}$, un espace rigide D ([CM] §7 [4] puis [CH] §6), la "variété spectrale attachée à (M, U, H)", muni d'un morphisme fini $\pi : D \to Z$. On dispose de plus d'un morphisme d'anneaux $a : H \to A(D)$, ainsi que d'un diagramme commutatif :

$$\begin{tikzcd}
D \arrow[dd, "\kappa"'] \arrow[dr, "\pi"] \arrow[drr, "a(U)^{-1}"] & & \\
& Z \arrow[r, "pr_2"'] \arrow[dl, "pr_1"] & \mathbb{A}^1_{rig} \\
\mathcal{W} & &
\end{tikzcd}$$

H, $U \in H$ et $\mathcal{W}$ étant fixés, on note $\mathcal{E}$ la catégorie dont les objets sont les couples (π, a) formés d'un morphisme d'espaces rigides $\pi : D \to Z$ au dessus de $\mathcal{W}$, ainsi que d'un morphisme d'anneaux $a : H \to A(D)$ tel que $a(U)^{-1} = pr_2 \cdot \pi$. Les morphismes $\mathrm{Hom}((\pi_1, a_1), (\pi_2, a_2))$ sont ceux $(\varphi_D, \varphi_Z) : \pi_1 \to \pi_2$ au dessus de $\mathcal{W}$ tels que $\forall h \in H, a_2(h) \cdot \varphi_D = a_1(h)$. Si $X = (\pi, a)$ est un objet de $\mathcal{E}$, on notera $D(X)$ (resp. $Z(X)$) l'espace rigide D source (resp. Z but) de π, $a(X) := a$, $\pi(X) := \pi$. Si (M, U, H) est comme plus haut, on notera $\mathcal{E}(M)$ l'objet de $\mathcal{E}$ associé à M par la construction précédente. On notera de plus $\mathcal{E}(M)^{\mathrm{red}}$, la réduction de $\mathcal{E}(M)$, l'objet $(\pi^{\mathrm{red}}, a^{\mathrm{red}})$ de $\mathcal{E}$, défini par

$$\pi^{\mathrm{red}} : D^{\mathrm{red}} \overset{can}{\hookrightarrow} D \xrightarrow{pi} Z, \;\; a^{\mathrm{red}} : H \xrightarrow{a} A(D) \xrightarrow{can} A(D)/\mathrm{Nilrad}(A(D))$$

Proposition 6.2. *Soient (M^1, U, H) et (M^2, U, H) comme plus haut, on suppose*

$$\forall h \in H, Fred_{M^1}(hU) = Fred_{M^2}(hU)$$

Alors $\mathcal{E}(M^1)^{red}$ et $\mathcal{E}(M^2)^{red}$ sont canoniquement isomorphes.

Preuve : Par hypothèse, $Z(\mathcal{E}(M^1)) = Z(\mathcal{E}(M^2))$, on la note Z, elle est munie de sa première projection $pr_1 : Z \to \mathcal{W}$, on pose de plus $D_i = D_i(\mathcal{E}(M^i))$, $\mathcal{E}(M^i) = (\pi_i, a_i)$. Soit $\mathcal{C}$ le recouvrement canonique de $Z \to \mathcal{W}$, $\Omega \in \mathcal{C}$, $V := pr_1(\Omega)$ est un ouvert affinoide de $\mathcal{W}$, et par hypothèse $\Omega \to pr_1^{-1}(V)$ est un ouvert fermé fini sur V. Pour n assez grand, $M^i(V, n)$ contient alors un sous-$A(V)$-module localement libre de rang fini, "indépendant de n", dont on note $M^i(\Omega)$ l'image dans $M_i(V)^\dagger$. $M^i(\Omega)$ hérite d'une action de H, $\rho_i(U)$ ayant pour polynôme caractéristique le polynôme associé à la donnée de Ω (cf. par exemple [CH] 6.3.3). Soit $H_V := H \otimes_{\mathbb{C}_p} A(V)$, par construction $D_i(\Omega)$ est l'affinoide d'algèbre l'image de H_V dans $\mathrm{End}_{A(V)}(M^i(\Omega))$.

[4] Il s'agit de la construction "D" de la courbe de Hecke dans [CM], uniquement basée sur de la théorie spectrale, nous ne nous occupons pas dans ce texte de la "C"

Soit $h \in H$, montrons que si $P_{i,h}(X) := \det(h_{|M^i(\Omega)} - X.1)$, alors $P_{1,h}(X) = P_{2,h}(X)$. $V \subset \mathcal{W}$ étant réduit, il suffit de le faire après évaluation en tout $x \in V(\mathbb{C}_p)$. Soit $x \in V(\mathbb{C}_p)$, alors le corollaire 4.3 s'applique à (H, U) agissant sur les systèmes de modules de Banach M^i_x, on en conclut que les même caractères de H apparaissent dans les semi-simplifications de ces deux espaces (avec multiplicités). $M^i(\Omega)_x$ est par définition le sous-espace de $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} M^i_{x,n}$ sur lequel $\rho_i(U)$ a ses valeurs propres d'inverse dans $pr_1^{-1}(\{x\}) \cap \Omega$, et ces dernières ne dépendent pas de i, la série caractéristique de U n'en dépendant pas. Il vient donc $P_{1,h}(X)(x) = P_{2,h}(X)(x)$, puis $P_{1,h}(X) = P_{2,h}(X)$. Si plus généralement $h \in H_V$, on a encore $P_{1,h}(X) = P_{2,h}(X)$ car par l'argument précédent on a cette égalité après évaluation en tout $x \in V(\mathbb{C}_p)$.

Soit I_i l'idéal de H_V noyau du morphisme $H_V \to \mathrm{End}_{A(V)}(M^i(\Omega))$, prouvons que $\sqrt{I_1}=\sqrt{I_2}$. Soit $f \in I_1$, alors $P_{1,h}(X) = X^d$, d étant le rang de $M^1(\Omega)$ (égal au rang de $M^2(\Omega)$), on en déduit que $P_{2,h}(X) = X^d$ puis que $I_1^d \subset I_2$. Il vient $\sqrt{I_1} \subset \sqrt{I_2}$, puis par symétrie $\sqrt{I_1} = \sqrt{I_2}$, ce que l'on voulait. On en déduit l'existence d'un isomorphisme d'anneau H_V-linéaire : $\varphi^*(\Omega) : A(D_2(\Omega)^{\mathrm{red}}) \to A(D_1(\Omega)^{\mathrm{red}})$. Un tel morphisme H_V-linéaire est nécessairement unique s'il existe, il est au dessus de $A(\Omega)$.

Soit alors $\varphi(\Omega) : D_1(\Omega)^{\mathrm{red}} \to D_2(\Omega)^{\mathrm{red}}$ l'isomorphisme induit au dessus de Ω. Vérifions que si $\Omega' \subset \Omega \in \mathcal{C}$, φ_Ω envoie $D_1(\Omega')^{\mathrm{red}}$ dans $D_2(\Omega')^{\mathrm{red}}$. Soit $V = pr_1(\Omega) \subset \mathcal{W}$, $V' = pr_1(\Omega')$, alors $\Omega_{V'} := \Omega \cap pr_1^{-1}(V') \in \mathcal{C}$ et $D_i(\Omega_{V'})$ est l'ouvert $D_i(\Omega)^{\mathrm{red}} \times_V V'$ de $D_i(\Omega)^{\mathrm{red}}$. $\varphi(\Omega)$ induit un $H_{V'}$-isomorphisme $D_1(\Omega_{V'}) = D_1(\Omega)^{\mathrm{red}} \times_V V' \to D_2(\Omega)^{\mathrm{red}} = D_2(\Omega')^{\mathrm{red}}$, ce qui conclut le cas $\Omega' = \Omega_{V'}$. Il reste donc le cas $V = V'$. On a $D_i(\Omega)^{\mathrm{red}} = D_i(\Omega')^{\mathrm{red}} \coprod D_i(\Omega\backslash\Omega')^{\mathrm{red}}$. φ_Ω étant $A(\Omega)$ et H_V-linéaire sur les fonctions, elle envoie $D_1(\Omega')^{\mathrm{red}}$ isomorphiquement sur $D_2(\Omega')^{\mathrm{red}}$ au dessus de H_V et $A(\Omega')$. On conclut par unicité d'un tel morphisme que les φ_Ω se recollent en un isomorphisme $D_1^{\mathrm{red}} \to D_2^{\mathrm{red}}$ au dessus de Z par [BGR] 9.3.3/1. $\square$

Remarque : Il est bien sur faux en général que sous les hypothèses de la proposition 6.2, M^1 et M^2 soient des H-modules isomorphes ; 6.2 est la généralisation naturelle de 4.2.

Nous pouvons énoncer un résultat général combinant 4.5, 6.2 et 4.3. Fixons $\mathcal{W}$ réduit de dimension > 0 et relativement factoriel, (M^1, H, U) et (M^2, H, U) des systèmes de H-modules de Banach sur $\mathcal{W}$ munis de structures classiques sur un sous-ensemble très Zariski-dense $X \subset \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$ comme en 4.4, satisfaisant (Cl) :

Théorème 6.3. *Supposons pour tout $h \in H$, $x \in X$,*

$$\det(1 - ThU_{|M^{1,cl}_x}) = \det(1 - ThU_{|M^{2,cl}_x}) \in \mathbb{C}_p[T]$$

alors,

- $Fred_{M^1}(hU) = Fred_{M^2}(hU) \in 1 + TA(\mathcal{W})\{\{T\}\}$,
- $\mathcal{E}(M^1)$ *est canoniquement isomorphe à* $\mathcal{E}(M^2)$,
- *Pour tout* $x \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, $\mathcal{X}_U(M^1_x) = \mathcal{X}_U(M^2_x)$.

Nous allons énoncer, pour terminer ce paragraphe, un critère sur (M, U, H) assurant que $D(\mathcal{E}(M))$ est réduit. Ce passage peut être omis en première lecture, et apparaît ici par manque de référence satisfaisante. On fera les hypothèses suivantes sur $\mathcal{W}$: $\mathcal{W}$ est relativement factoriel ([C] §4), de dimension > 0, et pour tout $x \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, $\widehat{\mathcal{O}_{X,x}}$ est intègre. On suppose de plus que l'on dispose de $X \subset \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$ un ensemble très Zariski dense, et une structure classique sur X au sens de §4.4, satisfaisant (Cl). On fait de plus l'hypothèse de type "multiplicité 1" suivante :

"Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, pour presque tout $x \in X$, H agit de manière semi-simple sur $M_x^{cl} \cap M_x^{\leq \alpha}$"

Proposition 6.4. *Sous ces hypothèses, $D(\mathcal{E}(M))$ est réduit.*

Rappels : Si A est une algèbre affinoide, $x \in \mathrm{Specmax}(A)$, on notera A_x (resp. A_x^{rig}) le localisé Zariski (resp. rigide) en x ([BGR] 7.3.2). Ils sont tous deux locaux noethériens, ont des complétés canoniquement isomorphes, et A_x, A_x^{rig} et $\widehat{A_x}$ sont simultanément réduits ([BGR] 7.3.2/8). Notons que si $A \to A'$ est un morphisme plat entre anneaux noethériens, alors si A' n'a pas d'idéaux premiers associés immergés, il en va de même pour A. Ceci vaut en particulier pour $A_x \to A_x^{rig} \to \widehat{A_x^{rig}} = \widehat{A_x}$. Par exemple, si tous les A_x^{rig} sont sans composantes associées immergées, alors A est sans composante associée immergée. Enfin, pour qu'un anneau noethérien A sans composante associée immergée soit réduit, il suffit que pour un ensemble $\{x_1, ..., x_n\} \subset \mathrm{Specmax}(A)$ tel que chaque composante irréductible de $\mathrm{Spec}(A)$ contienne un des x_i, chacun des A_{x_i} soit réduit. En effet, sous ces hypothèses l'application canonique $A \to \oplus_{i=1}^r A_{x_i}$ est injective. En particulier, si un tel anneau A a son spectre irréductible, soit il est réduit, soit aucun des A_x, $x \in \mathrm{Specmax}(A)$ n'est réduit.

Preuve : On reprend les notations du début du §6.1, un point $z \in D(\mathbb{C}_p)$ sera dit classique si $\kappa(z) \in X$, et si le caractère de H obtenu par évaluation en z sur $D(\mathbb{C}_p)$ est dans la semi-simplification du H-module $M_{\kappa(z)}^{cl}$. Les points classiques sont alors très Zariski denses car $\mathcal{W}$ est relativement factoriel de dimension > 0, et par (Cl).

Soit $\Omega \in \mathcal{C}$ tel que $D(\Omega)$ contienne un point classique, il en contient alors un ensemble Zariski-dense. Soit $M(\Omega)$ le $A(V)$-module projectif de type fini associé à Ω comme dans la preuve de 6.2. Soit $u \in A(D(V)) \subset \mathrm{End}_{A(V)}(M(\Omega))$ nilpotent, par hypothèse de multiplicité 1, les évaluations de u sont nulles en presque tout x de $X \cap V(\mathbb{C}_p)$, et u est donc nul ; $D(V)$ est donc réduit s'il contient un point classique.

Soit $\Omega \in \mathcal{C}$ quelconque, montrons que les complétés des anneaux locaux aux points fermés de $D(\Omega)$ n'ont pas de composantes associées immergées. C'est en fait une propriété générale des sous-A-algèbres B de $\mathrm{End}_A(P)$ où A est intègre noethérien tel que les $\widehat{A_m}$, $m \in \mathrm{Max}(A)$, soient intègres, et P projectif de type fini sur A. En effet, si $m \in \mathrm{Max}(A)$ est fixé, $A' := \widehat{A_m}$, la platitude de $A \to A'$ entraîne que $B_m := B \otimes_A A'$ est canoniquement isomorphe à son image dans $\mathrm{End}_{A'}(P \otimes_A A') \simeq M_r(A')$, où $r := \mathrm{rg}_A(P)$. A' étant hensélien, B_m est un produit d'algèbres locales B_m^i finies sur A', sans A'-torsion, car incluse dans $M_r(A')$. En particulier si Q est un idéal premier associé de B_m^i, $Q \cap A'$ est un idéal premier de A' de même hauteur que Q annulant un élément de B_m^i, donc $Q \cap A' = 0$ et cette hauteur commune est nulle, ce que l'on voulait.

Les $D(\Omega)$ recouvrant D de manière admissible, tous les $\mathcal{O}^{rig}_{D,x}$, $x \in D$, sont sans composantes immergées associées, on conclut par le lemme suivant. $\square$

Lemme 6.5. *Soit $X/\mathbb{C}_p$ un espace rigide dont les anneaux locaux n'ont pas de composantes associées immergées, et ayant un ensemble Zariski dense de x tels que $\mathcal{O}^{rig}_{X,x}$ soit réduit, alors X est réduit.*

Preuve : Soit X^0 l'ensemble des x de X qui sont dans une seule composante irréductible de X, X^0 est un ouvert admissible de X. Soit $\mathrm{Red}(X) := \{x \in X, \mathcal{O}^{rig}_{X,x}$ est réduit $\}$, c'est (sans condition sur X) un ouvert admissible de X, on définit de même $\mathrm{Red}(X^0)$. $\mathrm{Red}(X)$ est Zariski-dense dans X, comme il est ouvert il y est aussi très Zariski-dense. On en déduit que $\mathrm{Red}(X^0)$ est Zariski-dense dans X^0. Les rappels ci-dessus assurent que $\mathrm{Red}(X^0)$ est un ouvert fermé admissible de X^0, on a donc $X^0 = \mathrm{Red}(X^0)$. Si V est un ouvert affinoide de X, $V \cap X^0$ est Zariski-dense dans V, et les rappels montrent que $V \subset \mathrm{Red}(X)$. $\square$.

6.6. **L'isomorphisme rigide analytique JL_p.** Soient $\mathcal{W}, N, p, d$ comme en §3,

$$D^{0,\varepsilon,d} := D(\mathcal{E}(F^{0,\varepsilon,d}))^{\mathrm{red}}, \quad D^{D,\varepsilon} := D(\mathcal{E}(F^{D,\varepsilon}))^{\mathrm{red}}$$

On note $Z \subset \mathcal{W} \times \mathbb{A}^1$ l'hypersurface de Fredholm associée à $\mathrm{Fred}_{F^{0,\varepsilon,d}}(U_p) = \mathrm{Fred}_{F^{D,\varepsilon}}(U_p)$ (théorème 5.6), $a := a(\mathcal{E}(F^{0,\varepsilon,d}))$, $a_D := a(\mathcal{E}(F^{D,\varepsilon}))$, on dispose aussi de morphismes naturels $D^{0,\varepsilon,d} \to \mathcal{W}$ et $D^{D,\varepsilon} \to \mathcal{W}$ que l'on notera par le même nom κ.

Théorème 6.7. *Il existe un unique isomorphisme rigide analytique $JL_p : D^{D,\varepsilon} \to D^{0,\varepsilon,d}$ au-dessus de $\mathcal{W}$, coïncidant avec la correspondance de Jacquet-Langlands sur les points classiques différents du point spécial. Il satisfait $\forall h \in \mathcal{H},\ a(h).JL_p = a_D(h)$.*

Avant de prouver ce théorème, rappelons qu'un point x de $D^{0,\varepsilon,d}(\mathbb{C}_p)$ (resp. $D^{D,\varepsilon}(\mathbb{C}_p)$) est dit **classique** si :

i) $\kappa(x) = (1+p)^k\zeta$, où $k \geq 2$ est un entier, $\zeta \in \mu_{p^\infty}$,

ii) le caractère $\mathcal{H} \to \mathbb{C}_p$ obtenu par l'évaluation en x apparaît dans la semi-simplification du $\mathcal{H}$-module $F^{0,\varepsilon,d,cl}_{(1+p)^k\zeta}$ (resp. $F^{D,\varepsilon,cl}_{(1+p)^k\zeta}$).

On notera x_0 le point de $D^{D,1}(\mathbb{C}_p)$ correspondant au caractère de $\mathcal{H}$ sur la droite des fonctions constantes dans $F^{D,1,cl}_{(1+p)^2}$, on l'appellera le **point spécial**.

Preuve : L'assertion d'unicité de 6.7 découle de la Zariski-densité des points classiques de $D^{D,\varepsilon}$. Le théorème 5.6 combiné à la proposition 6.2 assure l'existence d'un isomorphisme canonique $\phi : \mathcal{E}(F^{D,\varepsilon})^{\mathrm{red}} \to \mathcal{E}(F^{0,\varepsilon,d})^{\mathrm{red}}$. On définit alors

$$\mathrm{JL}_p : D^{D,\varepsilon} \to D^{0,\varepsilon,d}$$

comme étant l'isomorphisme induit par ϕ. Par construction, il est au dessus de $\mathcal{W}$ et satisfait $a = \mathrm{JL}_p.a_D$.

Prouvons que JL_p induit la correspondance de Jacquet-Langlands sur les points classiques non spéciaux. Rappelons (cf. par exemple [CH] 6.2.4, 6.2.5) que si $w \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, l'application qui a un point $x \in D^{0,\varepsilon,d}(\mathbb{C}_p)$ (resp. $D^{D,\varepsilon}(\mathbb{C}_p)$) tel que $\kappa(x) = w$ associe le caractère $\mathbb{C}_p$-valué de $\mathcal{H}$ d'évaluation en x induit une bijection entre $\kappa^{-1}(w)$ et $|\mathcal{X}_{U_p}(F_w^{0,\varepsilon,d})|$ (resp. $|\mathcal{X}_{U_p}(F_w^{D\varepsilon})|$, voir §4.1 pour la notation $|.|$). En particulier, si $x \in D^{D,\varepsilon}(\mathbb{C}_p)$ est un point classique non spécial, la relation $a = \mathrm{JL}_p.a_D$ assure que $\mathrm{JL}_p(x)$ correspond au même caractère de $\mathcal{H}$ que x. Or la correspondance de Jacquet-Langlands usuelle nous assure l'existence d'une forme classique de poids $\kappa(x)$ ayant ce caractère sous $\mathcal{H}$; par unicité (i.e par la bijection rappelée ci-dessus) le point de $D^{0,\varepsilon,d}(\mathbb{C}_p)$ correspondant est nécessairement $\mathrm{JL}_p(x)$, ce qui prouve le théorème. $\square$

Remarques : i) Par des techniques usuelles, on peut montrer que l'adhérence $\overline{\mathcal{H}}$ de la Λ-algèbre engendrée par l'image de $\mathcal{H}$ dans $A(D^{D,\varepsilon})$ est compacte. De ceci et de l'existence des représentations galoisiennes attachées aux formes modulaires classiques résulte facilement (voir par exemple [CH] §7) l'existence d'un unique pseudo-caractère continu de dimension 2

$$T : \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})_{Npd} \longrightarrow \overline{\mathcal{H}} \subset A(D^{0,\varepsilon,d})$$

tel que si l est premier avec $(l, Npd) = 1$, $T(\mathrm{Frob}_l) = a(T_l)$.

ii) $\mathrm{JL}_p(x_0)$ correspond à la forme modulaire parabolique surconvergente de poids 2, nouvelle en d, de q-développement $q + \sum_{n\geq 2} a_n q^n$ avec $a_l = l + 1$ si $(l, pd) = 1$, 1 si $l|d$, et p si $l = p$. Elle n'est pas classique au sens strict précédent, mais elle est quand même convergente sur tout $X_1(Np, d)$, bien que non cuspidale. Elle est "critique", car de pente 1 et de poids 2.

En prenant $X := \{(1+p)^k, k \geq 2 \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)\}$, les structures classiques sur X ci-dessus, $N = 1$, l'hypothèse de multiplicité 1 pour $\mathcal{H}$ agissant sur $M^{cl}_{(1+p)^k} \cap M^{\leq\alpha}_{(1+p)^k}$ sont vérifiées dès que $\frac{k-1}{2} > \alpha$ et 6.4 donne la

Proposition 6.8. *Si $N = 1$, $D(\mathcal{E}(F^{0,\varepsilon,d}))$ et $D(\mathcal{E}(F^{D,\varepsilon}))$ sont réduits.*

7. Quelques conséquences, remarques et questions

7.1. **Opérateurs thêta.** Soit $\kappa = (k, \chi)$ de conducteur m, $k \geq 2$, il existe un opérateur d'entrelacements surjectif

$$\mathcal{C}^{\dagger}_{(1+p)^{-2}\kappa} \longrightarrow (\mathcal{C}^{\dagger}_{(1+p)^{-2}\kappa^*}) \otimes \det{}^{k-1}, \quad f \mapsto (\frac{d}{dT})^{k-1}(f), \quad \kappa^* := (2-k, \chi)$$

en tant que représentations de $\mathbb{M}$ (cf. [B2] §6, voir aussi [ST] 5.5). Son noyau est l'espace des fonctions localement polynomiales de degré $\leq k-2$. Il induit un opérateur $\Theta^{1-k} : F^{D,\varepsilon}_{\kappa,0}[m] \to F^{D,\varepsilon}_{\kappa,0}[m]$ avec les notations de 3.4.2, tel que $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n(\Theta^{1-k}(f)) = n^{1-k}\Theta^{1-k}(f)$. Le noyau de Θ^{1-k} est le $\mathcal{H}$-module $S^D_k(Np^m, \varepsilon\chi\tau^{-k}, \mathbb{C}_p)$.

Du côté des courbes modulaires, on peut définir via l'application de Kodaira-Spencer ([C1] §4, [C3]) un opérateur $M_{2-k}(Np^m, d)^{\dagger} \to M_k(Np^m, d)^{\dagger}$ noté Θ^{k-1}, qui agit sur les q-développements par $(\frac{d}{dq})^{k-1}$, et satisfait donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n(\Theta^{k-1}(f)) = n^{k-1}\Theta^{k-1}(T_n(f))$.

Les formes modulaires classiques propres, de pente finie, de poids k et de niveau $Np^m d$ ne sont pas dans l'image de θ^{1-k}.

Si $x \in D^{D,\varepsilon}(\mathbb{C}_p)$ est non classique mais de poids κ, il existe une forme $f_x \in F_\kappa^{D,\varepsilon}[m]$ propre, non classique, ayant pour système de valeurs propres celui associé à x. $\Theta^{1-k}(f_x) \in F_{\kappa^*}^{D,\varepsilon}[m]$ est propre et non nul, et correspond donc à un point que l'on notera $\Theta^{1-k}(x) \in D^{D,\varepsilon}(\mathbb{C}_p)$. On définit de même $\Theta^{k-1}(x)$ pour tout $x \in D^{0,\varepsilon,d}(\mathbb{C}_p)$ de poids κ^*, 6.7 implique la :

Proposition 7.2. *Soit $x \in D^{D,\varepsilon}(\mathbb{C}_p)$ non classique de poids $\kappa(x) = (k, \chi)$, alors*

$$\Theta^{k-1}(JL_p(\Theta^{1-k}(x))) = x$$

7.3. **Questions.**

(Q1) Nous n'avons pas montré que les systèmes de modules de Banach $F^{0,\varepsilon,d}$ et $F^{D,\varepsilon}$ sont isomorphes. Est-il vrai, par exemple, que si $\kappa \in \mathcal{W}(\mathbb{C}_p)$, les sous-espaces de $(F_\kappa^{D,\varepsilon})^\dagger$ et de $(F_\kappa^{0,\varepsilon,d})^\dagger$ composés des vecteurs de pente finie sont des $\mathcal{H}$-modules isomorphes ? Cette version "non semi-simplifiée" de notre correspondance serait par exemple intéressante pour des questions de multiplicité 1 mieux comprises du côté GL_2 (essentiellement par la présence du q-développement).

(Q2) Existe-t'il une réalisation géométrique de la correspondance donnée ? Nous espérons revenir sur ce point dans un travail ultérieur.

(Q3) Plusieurs autres espaces de "formes modulaires p-adiques" naturels peuvent être définis autant au niveau quaternionique que pour GL_2. Par exemple, on peut remplacer les séries principales de I dans notre définition des formes quaternioniques p-adiques par des restrictions des séries cuspidales de $GL_2(\mathbb{Q}_p)$, qui apparaissent aussi en familles sur $\mathcal{W}$ et contiennent les représentations de dimension finie usuelles aux poids-caractères arithmétiques : à quoi correspondent-elles du côté GL_2 ?

Nous espérons revenir aussi sur l'étude d'une autre famille d'espaces de Banach (construite du côté elliptique cette fois-ci), obtenue en considérant les sections de ω^k sur la réunion finie des disques supersinguliers de $X_1(N)/\mathbb{C}_p$ (N premier à p disons). Ces espaces sont aussi liés à des espaces de formes modulaires quaternioniques pour D ramifiée en p et l'infini cette fois-ci (cf. une lettre de Serre à Tate [S2] pour une correspondance modulo p).

Références

[B1] **K.Buzzard** *Eigenvarieties*
En préparation (2002)

[B2] **K.Buzzard** *On p-adic families of automorphic forms*
Disponible à l'adresse http ://www.ma.ic.ac.uk/∼kbuzzard/maths/research/papers/index.html

[BGR] **S.Bosch, U.Güntzer & R.Remmert** *Non archimedian analysis*
Springer Verlag, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften **261**

[C] **B.Conrad** *Irreducible components of rigid analytic Spaces*
Annales de l'institut Fourier, **49**, 905-919 (1999).

[C1] **R.Coleman** *Classical and overconvergent modular forms*
Inventiones math. **124**, 214-241 (1996)

[C2] **R.Coleman** *P-adic Banach spaces & families of modular forms*
Inventiones math. **127**, 417-479 (1997)

[C3] **R.Coleman** *Classical and overconvergent modular forms of higher level*
Journal de théorie des nombres de Bordeaux **9**, 395-403 (1997)

[CH] **G.Chenevier** *Familles p-adiques de formes automorphes pour $GL(n)$*
Disponible à l'adresse http ://www.dma.ens.fr/∼chenevie/.

[CM] **R.Coleman & B.Mazur** *The Eigencurve*
Proc. Durham, 1996. London Math. Soc. Lecture Note Ser. **254**, (1998)

[H] **H.Hida** *Modular forms and Galois cohomology*
Cambridge university press **69**.

[JL] **H.Jacquet & R.Langlands** *Automorphic forms on GL_2*
Springer lecture notes **114**, (1970)

[K] **N.Katz** *p-adic properties of modular schemes and modular forms*
Modular functions of one variable 3, Springer lecture notes **350** , (1972)

[KI] **M.Kisin** *Overconvergent modular forms and the Fontaine-Mazur conjecture*
Preprint.

[S1] **J.-P. Serre** *Endomorphismes complètement continus des espaces de Banach p-adiques*
Publications Math. I.H.E.S. **12** (1962)

[S2] **J.-P. Serre** *Two letters on quaternions and modular forms (mod p)*
Oeuvres complètes, IV.

[ST] **P.Schneider & J.Teitelbaum** *Locally analytic distributions and p-adic representation theory, with applications to GL_2*
Journal AMS **15** , 443-468 (2002)